

# ANNALEN

DES

K. K. NATURHISTORISCHEN HOFMUSEUMS.

(SEPARATABDRUCK AUS BAND XVI. HEFT 1.)

Schedae ad „Kryptogamas exsiccatas“.

Centuria VII.

Herausgegeben von der

Botanischen Abtheilung

des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien.

Auctore Dr<sup>e</sup> A. Zahlbruckner.

601-630 } recd  
1386  
3086



WIEN 1901.

ALFRED HÖLDER,

K. UND K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.



Die Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums erscheinen in jährlich vier Heften, die einen Band bilden.

Der Pränumerationspreis für einen Band (Jahrgang) beträgt K 20.—.

Mittheilungen und Zusendungen, sowie Pränumerationsbeträge bitten wir zu adressiren: An das K. K. Naturhistorische Hofmuseum, Wien, I., Burgring 7.

Von dem K. K. Naturhistorischen Hofmuseum, sowie durch die Hof- und Universitäts-Buchhandlung von A. Hölder in Wien sind sämtliche Abhandlungen der »Annalen« als Separatabdrücke zu beziehen. Darunter:

	K h
Babor, Dr. J. F. Ueber <i>Aspidoporus limax</i> Fitz. (Mit 1 Tafel)	1.40
— Ueber die von Dr. H. Rebel 1896 in Ostrumelien gesammelten Nacktschnecken. (Mit 1 Taf.)	1.20
Bachmann, O., u. Gredler, V. Zur Conchylienfauna von China. XVIII. Stück. (Mit 27 Abbild.)	1.—
Bäumler, J. A. Mykologische Fragmente. Fungi novi Herbarii Musei Palatini Vindobonensis. (Mit 1 Tafel)	1.40
Beck, Dr. G. v. Flora von Südbosnien und der angrenzenden Hercegovina. I.—IX. Theil. (Mit 9 Tafeln)	25.60
Beck, Dr. G. v. und Zahlbruckner, Dr. A. Schedae ad »Kryptogamas exsiccatae«. Centuria I. (Mit 2 Tafeln) — IV.	6.40
Berwerth, Dr. Fr. Ueber Alnöß von Alnöß. (Mit 1 Tafel in Farbendruck)	2.—
— Ueber vulcanische Bomben von den canarischen Inseln nebst Betrachtungen über deren Entstehung. (Mit 2 Tafeln und 2 Abbildungen im Texte)	3.—
Böhm Edler von Böhmersheim, Dr. A. Zeitschriftenkatalog des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums	9.60
Brauer, Dr. Fr. Ansichten über die paläozoischen Insecten und deren Deutung. (Mit 2 Tafeln)	4.—
Braun, M. Trematoden der <i>Chiroptera</i> . (Mit 1 Tafel)	2.—
Brauns, Dr. Hans. Zur Kenntniss der südafrikanischen Hymenopteren. (Mit 1 Tafel)	3.—
— Ein neuer termitophiler Aphodier aus dem Oranje-Freistaat. (Mit Bemerkungen und 1 Tafel von E. Wasmann S. J.)	—40
Brezina, Dr. Ar. Cliftonit aus dem Meteoreisen von Magura (Zusammen mit Weinschenk, E. Ueber einige Bestandtheile des Meteoreisens von Magura)	1.—
— Die Meteoritensammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums am 1. Mai 1895. (Mit 2 Tafeln und 40 Abbildungen im Texte)	8.—
Cohen, E., und Weinschenk, E. Meteoreisen-Studien I.	1.60
Cohen, E. Die Meteoriten von Laborel und Guareña	1.—
— Meteoreisen-Studien. II.—XI.	11.—
Dreger, Dr. J. Die Gastropoden von Häring bei Kirchbichl in Tirol. (Mit 4 Tafeln)	4.—
Ferrari, Dr. E. v. Die Hemipteren-Gattung <i>Nepa</i> Latr. (Mit 2 Tafeln)	4.—
Finsch, Dr. O. Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee. (Mit 25 Tafeln, davon 6 in Farbendruck, und 108 Figuren im Texte)	50.—
Fischer, L. H. Indischer Volksschmuck und die Art ihn zu tragen. (Mit 6 Tafeln und 51 Abbildungen im Texte)	10.—
Friese, H. Monographie der Bienengattungen <i>Megacilissa</i> , <i>Caupolicana</i> , <i>Diphaglossa</i> und <i>Oxaea</i>	1.40
— Monographie der Bienengattung <i>Centris</i> (s. lat.)	5.60
Fritsch, Dr. K. Beiträge zur Kenntniss der Chrysobalanaceen. I.—II.	2.—
Ganglbauer, L. Sammelreisen nach Südungarn und Siebenbürgen. Coleopterologische Ergebnisse derselben. I. Theil	1.20
Garbowski, Dr. Tad. Sternosacrale Scoliose bei Rasoren und anatomische Folgen. (Mit 1 Tafel und 2 Abbildungen im Texte)	2.—
Gredler, P. V. Zur Conchylien-Fauna von China. (Mit 1 Tafel)	1.60
Haberlandt, Dr. M. Die chinesische Sammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums in ihrer Neuauftellung. (Mit 18 Abbildungen im Texte)	1.60
Handlirsch, A. Die Hummelsammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. (Mit 1 Tafel)	3.20
— Monographie der Phymatiden. (Mit 6 Tafeln und 35 Abbildungen im Texte)	11.20
— Zur Kenntniss der Stridulationsorgane bei den Rhynchoten. Ein morphologisch-biologischer Beitrag. (Mit 1 Tafel und 15 Textfiguren)	1.80
Heger, F. Altmexikanische Reliquien aus dem Schlosse Ambras in Tirol. (Mit 5 Tafeln)	7.—
Hein, A. R. Malerei und technische Künste bei den Dajaks. (Mit 10 Tafeln und 80 Abbildungen im Texte)	12.—
Hein, Dr. W. Zur Entwicklungsgeschichte des Ornamentes bei den Dajaks. (Mit 29 Abbildungen im Texte)	3.—
— Indonesische Schwertgriffe. (Mit 101 Abbildungen im Texte)	4.—
Hlawatsch, C. Ueber den Stolzit und ein neues Mineral »Raspit« von Brokenhill. (Mit 1 Tafel und 2 Abbildungen im Texte)	1.60
Hoernes, Dr. R. <i>Pereiraia Gervaisii</i> Véz. von Ivandol bei St. Bartelmae in Unterkrain. (Mit 2 Tafeln und 2 Abbildungen im Texte)	3.—
Jahresberichte des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. Von Dr. Franz Ritter von Hauer und Dr. Franz Steindachner. Für 1885 (mit 1 Tafel), 1886 bis 1899, je	2.—
Kittl, E. Die Miocänablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevieres und deren Faunen. (Mit 3 Tafeln)	7.—
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säugethiere von Maragha in Persien. I. Carnivoren. (Mit 5 Tafeln)	7.—
— Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. I.—III. Theil. (Mit 21 lithogr. Tafeln)	34.—
— Die Gastropoden der Esinokalke, nebst einer Revision der Gastropoden der Marolatakalke. (Mit 18 Tafeln und 112 Abbildungen im Texte)	20.—
Klatt, Dr. F. W. Neue Compositen aus dem Wiener Herbarium	1.—

601-630 . + 1386+308(b)

KRYPTOGAMAE EXSICCATAE  
EDITAE A MUSEO PALATINO VINDOBONENSI.

# Fungi.

checked  
from Schoda

Decas: 19-21





# Schedae ad »Kryptogamas exsiccatas«

editae a Museo Palatino Vindobonensi.

Auctore

*Dre. A. Zahlbruckner.*

Centuria VII.

Unter Mitwirkung der Herren: † F. Arnold, F. A. Artaria, Dr. E. Bauer, J. A. Bäumler, J. Baumgartner, Dr. G. v. Beck, J. Dörfler, Dr. F. Filárszky, A. Handlirsch, Dr. A. Hansgirg, Dr. H. E. Hasse, Dr. Fr. v. Höhnelt, Marshall G. Howe, † J. B. Jack, Dr. K. v. Keissler (Pilze z. Th.), † E. Kernstock, Dr. F. Krasser (Algen), P. Kuckuck, † H. Lojka, Dr. J. Lütkemüller, K. Loitlesberger, J. v. Lorenz, Dr. A. Mágócsy-Dietz, Dr. P. Magnus, F. Matouschek, G. v. Niessl, O. Nordstedt, F. Pfeiffer v. Wellheim, F. X. Rieber, H. Sandstede, Dr. V. Schiffner, Dr. K. Schilberszky, Dr. H. Schinz, J. Schuler, J. Sikora, Dr. S. Stockmayer, P. P. Strasser, Dr. C. Toldt, A. Willi, Dr. A. Zahlbruckner

herausgegeben

*von der botanischen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums  
in Wien.*

## Fungi (Decades 19—21).

### 601. *Peronospora Ficariae*.

Tulasne, Compt. rendus de l'Acad. d. Scienc., Paris, t. XXXVI, I (1854), p. 1103; Sacc., Syll. fung., VII, 1 (1888), p. 251; Fischer apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1892), S. 472. — *Peronospora grisea* Rabenh., Herb. mycol., ed. II (1851), p. 322. — *Peronospora nivea* Ung. in Botan. Zeit., V (1847), p. 314 ex parte. — *Peronospora Myosuri* Fuck., Symb. mycol., I (1869), p. 67 (an variet?).

Austria inferior: ad folia *Ranunculi repentis*, in pratis paludosis prope Kaltenleutgeben  
leg. F. de Höhnelt.

### 602. *Peronospora calotheca*.

De Bary in Ann. d. scienc. nat. Botan., ser. IV, t. XX (1863), p. 111; Sacc., Syll. fung., VII, 1 (1888), p. 245; Fischer apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1892), S. 450. — *Peronospora Galii* Fuck., Fungi rhen. (1865), nr. 28. — *Peronospora Sherardiae* Fuck., Fungi rhen. (1865), nr. 31.

Hungaria (Com. Posoniensis): ad folia *Galii silvatici*, Bodinggraben prope Pozsony  
leg. J. A. Bäumler.

### 603. *Peronospora Alsinearum*.

Casp. in Ber. üb. Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berl. (1855), S. 330; Sacc., Syll. fung., VIII, 1 (1888), p. 246; Fischer apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1892), S. 452. — *Peronospora conferta* Ung. in Botan. Zeit., V (1847), S. 314 ex parte. — *Peronospora Lepigoni* Fuck., Fungi rhen. (1865), nr. 21. — *Peronospora tomentosa* Fuck., Fungi rhen. (1865), nr. 15. — *Protomyces Stellariae* Fuck., Enum. Fung. Nassov., ser. I (1860), p. 1 (status oosporicus).

Hungaria: ad folia *Stellariae mediae*, Budapest, in horto botanico universitatis leg. A. Mágócsy-Dietz.

### 604. *Peronospora Linariae*.

Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 70; Sacc., Syll. fung., VII, 1 (1888), pag. 255; Fischer apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1892), S. 452. — *Peronospora Antirrhini* Schroet. in Hedwigia, XIII (1874), p. 183 et apud Cohn, Kryptfl. v. Schles., III, 1, Pilze (1889), S. 248?

Brandenburgia: ad folia *Linariae minoris*, Berlin, in horto botanico universitatis leg. P. Magnus.

### 605. *Plasmopara nivea*.

Schroet. apud Cohn, Kryptfl. v. Schles., III, 1, Pilze (1889), S. 237; Sacc., Syll. fung., VII, 1 (1888), p. 240; Fischer apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1892), S. 240. — *Botrytis nivea* Ung., Die Exanth. d. Pflanz. (1833), S. 171, tab. 2, fig. 14. — *Botrytis macrospora* Ung., ibid., p. 173. — *Peronospora nivea* Ung. in Botan. Zeit., V (1847), S. 314 ex parte. — *Peronospora macrospora* Ung., ibid., p. 315. — *Peronospora macrocarpa* Rabenh., Herb. mycol., ed. I, nr. 1172. — *Peronospora Conii* Tulasne in Compt. rendus de l'Acad. d. scienc., Paris, tom. 36, I (1854), p. 1103. — *Peronospora Umbelliferarum* Casp. in Ber. üb. Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin (1855), S. 328.

a) Austria inferior: ad folia *Anthrisci silvestris* prope Moosbrunn leg. F. de Höhncl.

b) Austria inferior: ad folia *Aegopodii Podagrariae* prope Purkersdorf leg. F. de Höhncl.

### 606. *Clavaria fistulosa*.

Holmsk., Coryph., Clavar. (1797), p. 34 et Fung. Danic. (1799), p. 9, tab. 61; Flora Danic., fasc. 29 (1799), tab. 1256; E. Fries, Syst. mycol., I (1821), p. 479 et Hymenomyc. Europ. (1874), p. 677; Sacc., Syll. fung., II (1888), p. 723. — *Clavaria teres, fistulosa* Schmidel, Icon. Plant., edit. curante J. Chr. Keller (1762), p. 56, tab. 15. — *Clavaria pilipes* Vahl in Flora Danic., fasc. 18 (1792), tab. 1076, fig. 1.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad ramulos emortuos in sylvis ad pedem montis »Kleiner Ahornberg« prope St. György, ca. 600 m s. m. leg. A. Zahlbruckner.

In der ganzen neuen mykologischen Literatur läuft mit seltener Einmüthigkeit für *Clavaria pilipes* das falsche Citat: »Flora Danica, tab. 1100, fig. 3«.

A. Zahlbruckner.

### 607. *Cyclomyces fuscus*.

Kunze apud Fries in Linnaea, V (1830), p. 512, tab. 11, fig. 3; Sacc., Syll. fung., VI (1888), p. 389. — *Cyclomyces australis* Krombh., Naturgetr. Abh. u. Beschr. Schwämme, Heft 1 (1831), p. 75, tab. 4, fig. 17, 18.



**Var. madagascariensis.**

Keissl. nov. var.

Cinnamomeus, fere decalvescens.

Der typische »*C. fuscus*« wurde bisher nur auf der Insel Mauritius gefunden. Die hier vorliegenden Exemplare stammen von der benachbarten Insel Madagascar, unterscheiden sich aber von dem typischen *C. fuscus* durch die hellere (zimmtbraune) Farbe und dadurch, dass die Oberseite des Hutes, welche an den Originalexemplaren von Kunze in Sieber, Crypt. exs., nr. 63, die in dem Herbar der botanischen Abtheilung des hiesigen Hofmuseums aufliegen, dicht sammtig ist, hier nur eine schwache Haarbedeckung aufweist.

C. de Keissler.

Madagascaria: ad truncos

leg. J. Sikora.

**608. Polystictus perennis.**

E. Fries, Nov. Sym. (1851), p. 55; Cooke in Grevillea, XIV (1886), p. 77; Sacc., Syll. fung., VI (1888), p. 210. — *Boletus perennis* Linné, Spec. plant. (1753), p. 1177. — *Polyporus perennis* E. Fries, Syst. mycol., I (1821), p. 350; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 1 (1884), S. 446.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad terram argillaceam viarum sylvaticarum ad pedem montis »Kleiner Ahornberg« prope Szt. György, ca. 550 m s. m.

leg. A. Zahlbruckner.

**609. Polyporus imbricatus.**

E. Fries, Syst. mycol., I (1821), p. 357 et Hymenomyc. Europ. (1874), p. 542; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 1 (1884), S. 438; Sacc., Syll. fung., VI (1888), p. 106. — *Boletus imbricatus* Bull., Hist. Pl. Vénén. France (1784), p. 349, tab. 366.

Tirolia: ad truncos *Castanearum* prope Vahrn

leg. C. Toldt.

**610. Hypholoma fasciculare.**

Sacc., Syll. fung., V (1887), p. 1029. — *Agaricus fascicularis* Huds., Fl. angl., ed. II (1778), p. 615. — *Agaricus* (trib. *Hypholoma*) *fascicularis* Fries, Syst. mycol., I (1821), p. 288. — *Agaricus* (subg. *Hypholoma*) *fascicularis* Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 4 (1884), S. 651.

Austria inferior: in monte »Heuberg« prope Dornbach in ditione Vindobonensi

leg. G. de Beck.

**611. Claviceps purpurea.**

Tulasne in Ann. d. scienc. nat. Botan., ser. III, tom. XX (1853), p. 45; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 564; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), p. 146. — *Sphaeria purpurea* Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 325, pro parte. — *Sclerotium Clavus* Lam. et De Cand., Fl. franc. (ed. III), VI (1815), p. 115 (Mycel. quiet.).

a) Austria inferior: in caryopsidibus *Secalis Cerealis*, Aspanger Klause prope Mariensee

leg. J. Dörfler.

b) Hungaria: in caryopsidibus *Secalis Cerealis*, prope Csép in insula Danubiali »Csepel«

leg. C. Schilberszky.

**612. Nectria cinnabarina.**

Fries, Summa veget. Scand. sect. poster. (1849), p. 388. — *Sphaeria cinnabarina* Tode, Fungi mecklenb., fasc. II (1791), p. 9. — *Sphaeria decolorans* Pers., Syn. fung.,

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XVI, Heft 1, 1901.

I (1801), p. 49. — *Sphaeria pezizoidea*  $\alpha$ ) *rubrofusca* Lam. et De Cand., Fl. franc. (ed. III), VI (1815), p. 125. — *Cucurbitaria cinnabarina* Grev., Scott. Crypt. Fl., III (1825), tab. 135.

Principatus Badensis: ad corticem *Aceris campestris*, prope Salem

leg. J. B. Jack.

### 613. *Nectria galligena*.

Bresad. apud Strasser in Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges., LI. Jahrg. (1901), S. 413.

Austria inferior: ad gallos *Salicis purpureae* per totum annum, sed non frequens, apud viam ferream prope Rosenau

leg. P. P. Strasser.

### 614. *Microsphaera Caraganae*.

Magnus in Ber. d. deutsch. bot. Ges., XVII (1899), S. 250, tab. IX.

Brandenburgia: ad folia *Caraganae arborescentis*, Wannsee prope Potsdam

leg. P. Magnus.

Locus classicus!

### 615. *Bertia moriformis*.

De Notar. in Giorn. bot. ital., I (1844), p. 335; Sacc., Syll. fung., I (1882), p. 582; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 237. — *Sphaeria moriformis* Tode, Fungi mecklenb., fasc. II (1791), p. 22, tab. XI, fig. 90. — *Sphaeria claviformis* Sowerby, Engl. fung. (1797—1809), tab. 337. — *Sphaeria rubiformis* Sowerby, l. c., tab. 373, fig. 2. — *Sphaeria verrucosa* Grev., Scott. Crypt. Fl., I (1823), tab. 39. — *Sphaeria rugosa* Grev., Fl. Edin. (1824), p. 364.

Austria: ad ramulos putridos ecorticatos *Fagi silvaticae*, Schachernwald in monte »Reisalpe« prope Lilienfeld

leg. F. de Höhnelt.

### 616. *Cucurbitaria Berberidis*.

A. Gray, Natur. Arrang. Brith. Plants I (1821), p. 519; Grev., Scott. Crypt. Fl., II (1824), tab. 84; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 308; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 319. — *Sphaeria Berberidis* Pers., Tent. disp. meth. fung. (1797), p. 3.

Austria inferior: in ramulis siccis *Berberidis vulgaris*, in monte »Sonntagberg« prope Rosenau

leg. P. P. Strasser.

Adest etiam *Pleonectria Lamyi* Sacc.

### 617. *Cucurbitaria elongata*.

Grev., Scott. Crypt. Fl., IV (1826), tab. 195; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 309; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 322. — *Sphaeria elongata* Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 422. — *Sphaeria scabra* (?) Kunze u. Schmidt, Mykol. Hefte, I (1817), S. 58.

Austria inferior: in ramulis emortuis *Robiniae Pseudacaciae* in monte »Hundsheimer Berg« prope Hainburg

leg. J. Baumgartner.

### 618. *Guignardia rhytismoides*.

A. Zahlbr. — *Sphaeria rhytismoides* Bab. et Berk., Fungi Britt., nr. 178. — *Laestadia rhytismoides* Sacc., Syll. fung., I (1882), p. 424. — *Carlia rhytismoides* OK.,



Revis. Gener. Plant., II (1891), p. 846. — *Sphaeria Dryadis* Fuck., Symb. mycol., I (1869), p. 108, tab. 2, fig. 41.

Helvetia: ad folia *Dryadis octopetalae* prope Arosa (Graubünden)

leg. P. Magnus.

### 619. *Leptosphaeria aucta*.

Niessl apud Rabenh. in Hedwigia, XVI (1877), p. 118; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 46; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 485.

a) Austria inferior: in caulibus siccis *Clematidis rectae*, Gaisberg prope Perchtoldsdorf (Petersdorf)

leg. J. Lütkemüller.

b) Austria inferior: in caulibus siccis *Clematidis rectae*, prope St. Veit (Vindobona)

leg. C. de Keissler.

### 620. *Leptosphaeria scirpina*.

Wint. in Hedwigia, XI (1872), p. 146 et in Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 455. — *Metasphaeria scirpina* Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 182.

Austria superior: in culmis siccis *Scirpi lacustris* ad marginem lacus »Attersee«

leg. J. Lütkemüller.

### 621. *Leptosphaeria Rousseliana*.

Ces. et de Not., Schem. sfer. ital. in Comment. d. soc. crittog. ital., I, nr. 4 (1863), p. 236 [62]; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 71; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 454. — *Sphaeria Rousseliana* Desmaz. in Ann. d. scienc. nat. Botan., ser. III, tom. XI (1849), p. 355.

Die sehr kleinen, mit freiem Auge schwer zu unterscheidenden, jedoch nach der Befeuchtung des Substrates deutlich hervortretenden Perithezien enthalten in den vorliegenden Exemplaren reichlich Schläuche mit reifen Sporen. An der Identität mit den in meinem Herbar befindlichen Originalen Exemplaren aus der Sammlung Desmazières ist nicht zu zweifeln.

G. Niessl.

Moravia: ad vaginas culmorum siccorum *Phlei Boehmeri*, prope Brünn

leg. G. de Niessl.

### 622. *Leptosphaeria Nardi*.

Ces. et De Not., Schem. sfer. ital. in Comment. d. soc. crittog. ital., I, nr. 4 (1863), p. 236 [62]; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 72; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 454. — *Sphaeria Nardi* Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 520. — *Pleospora Nardi* Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 137.

Die Asci sind 60—80  $\mu$  lang, 9—12  $\mu$  breit; die Sporen 22—25  $\mu$  lang und 4  $\mu$  breit; befinden sich jedoch die Asci im gestreckten Zustande, so sind dieselben 110  $\mu$  lang und nur 7—8  $\mu$  dick, so dass Winters Bemerkungen bezüglich des Schlauchmasses hier vollkommen zutreffen.

J. A. Bäumler.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad culmos siccos *Nardi strictae*, prope Pozsony

leg. J. A. Bäumler.

### 623. *Ophiobolus fruticum*.

Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 347; Wint. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), S. 531. — *Sphaeria fruticum* Desmaz. in Ann. d. scienc. nat. Botan., ser. III, tom. XVI (1851), p. 308. — *Rhaphidospora Ononidis* Auersw. in Rabenh., Fungi europ., nr. 359. — *Rhaphidospora fruticum* Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 125.

Hungaria (Com. Trencsén): ad caules siccos *Ononidis spinosae*, prope Trencsén

leg. J. A. Bäumler.

Teplicz



**624. Calospora platanoides.**

Niessl in Hedwigia, XIV (1875), p. 130; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 231. — *Sphaeria platanoides* Pers., Syn. fung., pars I (1801), p. 45. — *Sphaeria stilbostoma* γ) conferta Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 404. — *Valsa Innesii* Curr. in Transact. Linn. soc. Lond., XXII (1859), p. 281, tab. XLVIII, fig. 164 et 165. — *Diaporthe Innesii* Nke. in Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 204. — *Valsa platanoides* Berk. in Cooke, Handbook of Brit. Fungi, vol. II (1871), p. 837. — *Calospora Innesii* Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 231. — *Pseudovalsa platanoides* Wint. in Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 2 (1887), p. 790.

Die Asci sind 70—90 μ lang und 14—16 μ breit, die Sporen 24—30 μ lang, 6—8 μ breit, hyalin, dreifach septiert und an den Seiten meist etwas eingeschnürt, wie dies auch Winter angibt; so vollkommen glatte Sporen, wie sie Berlese in den Icones Fungorum, I, tab. CXXI, fig. 3 abbildet, fand ich nicht. Da die in Rede stehende Art vollkommen hyaline Sporen hat, so ist sie besser zu *Calospora* als zu *Pseudovalsa*, wo sie Winter einreichte, zu stellen.

J. A. Bäumler.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad ramos emortuos *Aceris platanoidis*, prope Pozsony leg. J. A. Bäumler.

**625. Phyllachora Crotonis.**

Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 599; Rehm in Hedwigia, XXXVI (1897), p. 599. — *Dothidea Crotonis* Cooke in Grevillea, X (1882), p. 129. — *Trabutia crotonicola* Rehm in Hedwigia, XXIX (1890), p. 160.

Brasilia: ad folia viva *Crotonis floribundi* ad aquaeductum prope Rio de Janeiro leg. F. de Höhnelt.

**626. Phyllachora Pteridis.**

Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 218; Sacc., Syll. fung., II (1883), p. 607. — *Sphaeria Pteridis* Rebert., Prodr. Fl. Neomarch. (1804), p. 324, tab. 1, fig. 3. — *Dothidea Pteridis* Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 555.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieser Pilz von Winter in der Bearbeitung der Pyrenomyceten in Rabenhorsts Kryptogamenflora aus Versehen nicht angeführt wird.

C. Keissler.

Carinthia: in foliis *Pteridis aquilinae*, ad lacum »Faaker-See«

leg. A. Handlirsch.

**627. Nesolechia punctum.**

Mass., Sched. critic., V (1856), p. 96; Körb., Par. Lich. (1865), p. 461. — *Lecidea oxysporella* Nyl. in Mém. soc. sc. Cherbourg, V (1857), p. 127 et Synops. Lich. (1858), p. 223 (nomina nuda!). — *Nesolechia oxysporella* Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 3 (1890), S. 316; Sacc., Syll. fung., X (1892), p. 53; Zopf in Hedwigia, XXXV (1896), p. 323.

Oldenburgia: ad thallum *Gladoniae cornucopioidis* prope Zwischenahn

leg. H. Sandstede.

Wie aus den obigen Citaten hervorgeht, hat Massalongo unbedingt die Priorität, denn Rehm (a. a. O.) irrt, wenn er für Nylanders »Énumérat. géner. des Lichenes« das Jahr 1850 (statt 1857) annimmt. Ausserdem ist zu beachten, dass Nylander für seine *Lecidea oxysporella* nie eine Diagnose publicierte und somit dieses nomen nudum bei der Speciesbenennung nicht in Anwendung gebracht werden darf.

**628. Stamnaria Equiseti.**

A. Zahlbruckner.

Sacc., Syll. fung., VIII (1889), p. 620; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 3 (1891), S. 466. — *Lycoperdon Equiseti* Hoffm., Veget. crypt., II (1790),



p. 17, tab. 5, fig. 1. — *Peziiza Persoonii* Moug. in Pers., Mycol. europ., I (1822), p. 288, tab. 12, fig. 1. — *Stamnaria Persoonii* Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 309. — *Peziiza Equiseti* Rabenh. in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Lief. 10 (1882), p. 9, tab. 5, fig. 5. — *Habrocrystis Persoonii* Rehm in Hedwigia, XXI (1882), p. 70. — *Calycella Persoonii* Quél., Enchir. fung. (1886), p. 305. — *Phialea Persoonii* Gill., Champign. de France. Les Discom. (1879), p. 106.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad caules *Equiseti ramosissimi*, prope Pozsony  
leg. J. A. Bäumler.

## 629. *Fabraea Ranunculi*.

Karst., Rev. mon. et synops. Ascom. in Acta soc. pro fauna et fl. fennica, tom. II, nr. 6 (1885), p. 161; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 3 (1892), p. 601. — *Dothidea Ranunculi* Fries, Syst. mycol., II, 2 (1823), p. 562. — *Phacidium Ranunculi* Lib., Pl. crypt. Arduen., fasc. II (?) (1832), nr. 69. — *Phlyctidium Ranunculi* Wallr., Fl. crypt. germ., pars II in Bluff et Fingerh., Comp. fl. germ., tom. IV, sect. II (1833), p. 420. — *Excipula Ranunculi* Rabenh., Deutschl. Kryptfl., I (1844), p. 153. — *Pseudopeziiza Ranunculi* Fuck., Symb. mycol. (1869), p. 290; Sacc., Syll. fung., VIII (1889), p. 726. — *Mollisia Ranunculi* Phill., Man. brit. Discom., p. 200 sec. Rehm, l. c. — *Phacidium litigiosum* Rob. apud Desm. in Ann. d. scienc. nat. Botan., sér. III, tom. VIII (1847), p. 181. — *Fabraea litigiosa* Sacc., Syll. fung., VIII (1889), p. 735. — *Phacidium congener* Ces. in Klotzsch., Herb. mycol. (anno?), nr. 1538 sec. Rehm, l. c. — *Niptera congener* De Not. in Comment. crittog. ital., I, nr. 5 (1864), p. 375. — *Fabraea congener* Sacc. in Michel., I (1879), p. 515.

Es ist gewiss in vieler Hinsicht berechtigt, wenn Rehm die von Saccardo unterschiedenen Arten *Fabraea litigiosa*, *F. congener* und *Pseudopeziiza Ranunculi* in eine Art zusammenzieht, die er mit dem nach den Nomenclaturregeln richtig gewählten Namen *Fabraea Ranunculi* Karst. belegt.

C. de Keissler.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad folia *Ranunculi acris*, in silva »Spitalerwald« prope Pozsony  
leg. J. A. Bäumler.

## 630. *Lasiostictis fimbriata*.

Bäuml. — *Stictis fimbriata* Schwein., Syn. fung. Amer. bor. (1831), p. 986; Rehm apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, I, 3 (1896), S. 1218. — *Stictis (Lasiostictis) conigena* Sacc. et Berl. in Atti sc. litt. ed art. Venezia, ser. 6<sup>a</sup>, t. III (1884—1885), p. 734. — *Lasiostictis conigena* Sacc., Syll. fung., VIII (1889), p. 696. — *Stictis conicola* Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII (1887), S. 152.

Hungaria (Com. Poseniensis): in strobilis dejectis *Pini silvestris* in vinetis ad Szt. György  
leg. A. Zahlbruckner.

Apothecien eingesenkt, die Rinde hervorwölbbend und durchbrechend, am Rande mit einem feinen weissen, aus etwas gekrümmten, körnigen, 50—80  $\mu$  langen und 2  $\mu$  dicken Haaren gebildeten Haarkranz umgeben. Schläuche cylindrisch, fest sitzend, oben etwas zugespitzt, 70—100  $\mu$  lang und 7—9  $\mu$  breit, 8sporig. Sporen 50—60  $\mu$  lang, 1.5—2  $\mu$  breit, wurmförmig gekrümmt, zuerst mit feinen Oeltropfen erfüllt, endlich sehr fein 5—8 mal septiert.

In Saccardo und Berleses o. a. Arbeit wird *Lasiostictis fimbriata* als *Stictis (Lasiostictis) conigena* genau wie in »Sylloge fungorum« beschrieben und am Schlusse der Diagnose die Bemerkung »a genere Stictidis margine conopice piloso differt et probaliter novi generis typus« hinzugefügt. In Saccardos »Sylloge fungorum« wird

bereits die Gattung *Lasiostictis* angenommen und die Schlussbemerkung demgemäss weggelassen.

Dr. Rehm zieht Saccardo und Berleses Art zu *Stictis fimbriata* Schwein. Diese Auffassung ist vollkommen gerechtfertigt, da Schweinitz den Pilz gar nicht besser kenntlich machen konnte als mit den Worten seiner beigefügten Bemerkung »*Aecidium exacte refert*«, denn in der That erscheint der Pilz sowohl mit freiem Auge, als auch mit der Lupe betrachtet, als ein schöner *Aecidium*becher.

An dem vielen in schönster Entwicklung befindlichen Material, welches ich der Güte des Herrn Custos Dr. A. Zahlbruckner verdanke, kann ich die Aufstellung der Gattung *Lasiostictis* für diesen Pilz als vollkommen begründet erklären.

Bei Untersuchung dieses Pilzchens zeigt sich, dass der von Schweinitz, Saccardo und Berlese beobachtete Haarkranz eine von allen übrigen Pilzen abweichende eigenthümliche Entwicklung aufweist. Die hyalinen Hyphen entspringen vollkommen dem Gewebe, mit welchem der Pilz die Rinde ausfüllt; mit dem Wachsen der Hymenialschicht wird die bedeckende Rinde gehoben und gesprengt, nun stellen sich die Rindenpartien am Rande der Hymenialschicht auf und werden sogar nach aussen gebogen; das in den Rindenzellen befindliche Pilzgewebe verlängert sich und bildet bei weiterer Entwicklung den die Fruchtkbecher umgebenden schönen hyalinen Hyphenkranz. Ich fand einzelne Becherchen, die in der Mitte eine freie Partie rund aufgehobener Rinde hatten; dieselbe ist in der Mitte mit dem Grundgewebe durch verlängerte Hyphen angeheftet, an dem Rande ist selbst bei dieser Partie das Pilzgewebe zu den schönen, diese Gattung charakterisierenden Hyphen respective Haarkranz ausgewachsen.

Dass der ausgezeichnete Ascomycetenforscher Medicinalrath Dr. H. Rehm dieselbe als Zerfaserung der Rinde auffasst, ist nur dadurch zu erklären, dass er nur sehr altes Material zur Untersuchung vor sich hatte; die hyalinen Haare können nur als Fortsetzung der Pilzhypen und nicht als Faserproduct der Rinde aufgefasst werden.

An dem reichlichen mir vorliegenden Material fand ich wohl alte Apothecien, bei denen sowohl die Hymenialschicht ausgefallen, als auch der hyaline Kranz abgefallen war, doch die braunen Fasern, die Dr. Rehm erwähnt, fand ich nicht.

Um zu entscheiden, ob Hazslinskys *Stictis conicola*, wie Dr. Rehm vermuthet, hierher gehört, wendete ich mich an den Custos des kön. ung. Nationalmuseums in Budapest, Herrn Dr. A. Mágócsy-Dietz; derselbe hat mit gewohnter Freundlichkeit sich der Mühe unterzogen, die Originale Hazslinskys herauszusuchen, und nach seinen an dem sehr dürftigen Material vorgenommenen Untersuchungen ist kein Zweifel, da auch die Zeichnung der Sporen und Schläuche Hazslinskys dem Bilde Saccardo und Berleses entspricht, dass Hazslinskys Pilz mit dem vorliegenden identisch ist.

J. A. Bäumler.

## Addenda:

### 138. *Spathularia clavata*.

Sacc.

b) *Tirolia*: in locis humidis, in monte »Kuchelberg« prope Baumecken

leg. F. de Höhnelt.

### 308, b. *Polyporus adustus*.

E. Fries.

Hungaria: ad truncos *Ailanthi glandulosae* in horto botanico, Budapest

leg. A. de Mágócsy-Dietz.



## Algae (Decades 12—13).

### 631. *Nostoc verrucosum*.

Vauch., Hist. des Conf. (1803), p. 225, t. XVI, fig. 3; Bornet et Flahault, *Nostoc* hétér. in Ann. sc. nat., sér. 7, VII (1888), p. 216; Hansg., Prodr. Alg. Böhm., S. 66.

#### Nov. var. *Pseudo-Zetterstedtii*.

Stockmayer.

Differt ab ipsa specie thallo parvo (magnitudine usque ad nucis avellanae), satis firmo, varie et profunde dissecti, lobis irregulariter volutis, trichomatibus radiantibus in dissepimenta melius constrictis, articulis paulo longioribus.

*Tirolia meridionalis*: in rivulo frigido, rapidissime fluente in vico St. Zeno vallis dictae Nonsberg (Val di Non), 320 m s. m.; m. Sept. leg. S. Stockmayer.

Bornet, dem ich Exemplare dieses interessanten *Nostoc* eingesandt hatte, schrieb mir: Votre plante est très voisine du *N. parmelioides*, comme vous le dites très justement, non seulement par la fermeté de son thalle et la disposition rayonnante des trichomes, mais aussi par la forme de ses articles qui sont moins régulièrement discoides que le *N. verrucosum*. L'aspect général du thalle rappelle aussi le *N. Zetterstedtii*; toutefois celui-ci est plus régulièrement globuleux. Quelques individus de votre *Nostoc* sont envahis par un Champignon (Sphaeriaceé).«

Mir speciell scheint die Verwandtschaft mit *Nostoc Zetterstedtii* viel grösser zu sein als jene mit *N. parmelioides*, wenigstens wenn ich für letztere die von Gomont in »Contributions à la flore algologique de la Haute-Auvergne« [Bull. soc. bot. de France, tom. XLIII (1896), pl. IX, fig. 5—8] gegebene Abbildung zugrunde lege. Dieser Uebergang ist um so bemerkenswerter, als er zwei Bornet-Flahault'sche Sectionen der Gattung *Nostoc*, die bisher wenig verwandt und auch geographisch scharf getrennt schienen, verknüpft: die Section der »*Verrucosa*« und jene der »*Zetterstedtiana*«, deren erstere (*N. verrucosum* und *parmelioides*) rasch fliessende Bäche festsitzend, letztere (*N. Zetterstedtianum*) die Seen Schwedens freischwimmend bewohnt. In dieser Hinsicht schliesst sich unser *Nostoc* der ersten Gruppe an, der es sich ja, wie aus obiger Beschreibung hervorgeht, auch verwandtschaftlich näher anschliesst. Ein verkehrter, allerdings in der Algologie oft betretener Weg wäre es, das geographische Verhalten als ein systematisches Merkmal zu verwenden; denn morphologische und geographische Differenzierungen sollen ja gerade in ihren Wechselbeziehungen studiert werden, um auf den Stammbaum des Organismus Licht zu werfen. S. Stockmayer.

Bezüglich der Präparation des Exsiccates sei Folgendes bemerkt:

- a) Auf den Papieraufsammlungen wurde je ein Lager durch einen Längs- oder Querschnitt in seine beiden Hälften zerlegt, und diese sind nebeneinander aufgelegt.
- b) Auf den Gläschen sind sehr instructive Längsschnitte des Lagers.

F. Krasser.

### 632. *Nostoc microscopicum*.

Carmichael ex Harvey in Hooker, British Flora, V (1833), p. 399; Bornet et Flahault, Rev. *Nostoc* hétér. in Ann. sc. nat. (1888), tom. VII, p. 210, ubi cetera synonyma.

#### *Diplocolon Heppii*.

Naegeli in Itzigsohn, Phycol. Studien in Acta Leop. Carol.-Akad., XXVI, p. 160; Bornet et Flahault, l. c. (1887), tom. V, p. 129; Kirchner in Engler-Prantl, Natürl.

Pflzfam., I, 1a, S. 80. — Ueber den eventuellen genetischen Zusammenhang von *Diplocolon Heppii* mit *Nostoc microscopicum* vergleiche von neueren Schriften: Zukal, Ueber Diplocolonbildung in Notarisia, vol. V, p. 1036 und Ueber die Entstehung einiger *Nostoc*- und *Gloeocapsa*-Formen in Oest. bot. Zeitschr. (1889), S. 349.

**Austria inferior:** in rupibus irrigatis inter muscos in valle »Sauthal« prope Puchenstuben ad Scheibbs, m. Febr. leg. S. Stockmayer.

Insunt: *Nostoc muscorum* Agardh spärlich, *Scytonema crustaceum* Agardh var. *incrustans* Born. et Flah., l. c., p. 107, *Gloeocapsa aurata* Stitzenb., *Gloeocapsa coracina* Kütz., *Aphanocapsa montana* Cram., *Synechococcus aeruginosus* Naeg., *Urococcus insignis* Hassal.

Man wird in diesem Specimen vielfach Exemplare des *Nostoc microscopicum* finden, deren Ausmasse jenen von *N. macrosporum* Meneghini, Bornet et Flahault, l. c., p. 209 entsprechen. Die beiden Arten werden von Bornet und Flahault in ihrer classischen »Révision« auf Grund des ausgeprägten Unterschiedes in der Sporenform getrennt. Nun sind aber Sporen bei *N. macrosporum* nur ein einzigesmal von Borgi gefunden worden, nur Borgis Originalexemplare sind ein sicheres *N. macrosporum*. Denn die übrigen von Bornet und Flahault angeführten Unterscheidungsmerkmale (Grösse des Lagers, Fadendicke bei *N. macrosporum* 9—10  $\mu$ , bei *N. microscopicum* 5—8  $\mu$ ) sind zu einer Specialunterscheidung nicht ausreichend. Gerade unser Exemplar zeigt, wie sehr die Fadendicke schwankt.

Praktisch ergab sich nun bei der grossen Seltenheit von Sporen die Consequenz, dass man Exemplare mit über 8  $\mu$  dicken Trichomen zu *N. macrosporum*, mit weniger dicken zu *N. microscopicum* zog. Somit müsste man im vorliegenden Exsiccate beide Species als vorhanden constatieren, was mir ganz unberechtigt erscheint. Es müsste erst durch wiederholte Sporenfunde zur Evidenz erwiesen werden, dass wirklich regelmässig die über 8  $\mu$  dicken Trichome die eine, die dünneren die andere Sporenform producieren.

Die dicksten *Nostoc*-Fäden unseres Specimens zeigen in den Zellen sehr deutlich eine farblose Mitte »Centralsubstanz« von einer grünen Rinde differenziert.

Bezüglich der *Gloeocapsa* und *Aphanocapsa* sei schliesslich bemerkt, dass eine absolut sichere Bestimmung derselben bei dem heutigen Stande der Systematik dieser Genera undurchführbar ist.

S. Stockmayer.

### 633. *Gloeotrichia pisum*.

Thuret, Essai de classification des Nostochinées in Ann. sc. nat. Bot., sér. 6°, I (1875), p. 382; Kirchner, Algen in Cohn, Kryptfl. v. Schles., II (1878), S. 222; Hansg., Prodr. Alg. Böhm., II (1892), S. 44; Bornet et Flahault, Rev. Nostoc. hétér. in Ann. sc. nat. Bot., VII, sér. 4 (1886), p. 366 squ. — *Rivularia pisum* Ag., Syst. Alg. (1824), p. 25; Fl. Europ. Alg., II, S. 206; Kirchner, *Rivulariaceae* in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., Th. I, Abth. 1a (1898), S. 90.

**Helvetia:** Wallisellen prope Zürich in turfosis, m. Nov. leg. H. Schinz.

Aus den ausführlichen Literaturnachweisen, welche Bornet und Flahault, l. c., gegeben haben, geht hervor, dass sie auch die *Rivularia echinulata* English Botany (1814), tab. 1378, hierher beziehen. Dieselbe wird jedoch von Kirchner, l. c., wieder als Art angeführt. Es geht daraus hervor, dass für die Feststellung des Prioritätsnamens *Rivularia echinulata* jedenfalls ausser Betracht bleiben muss. Wohl kommt aber *Linckia hynicola* Lyngbye, »Hydrophytologia danica« (1819), p. 197, tab. 67 B, in Betracht. Wenn es auch höchst wahrscheinlich ist, dass es sich um *Gloeotrichia pisum*



der späteren Autoren handelt, so kann doch weder aus der Beschreibung und noch weniger aus der Abbildung wegen der mangelnden mikroskopischen Details, die auf derselben Tafel z. B. für *G. natans* zutreffend abgebildet werden, auf die in Rede stehende Art mit Sicherheit geschlossen werden. Es erscheint daher schon aus dem Grunde, um nicht durch eine möglicherweise falsche, jedenfalls aber nicht gänzlich einwurfsfreie Prioritätsnomenclatur die ohnehin genug schwierigen systematischen Beziehungen zu verdunkeln, geboten, an der von Bornet und Flahault gewählten Nomenclatur festzuhalten. Bezüglich der Gattungsumgrenzung hat schon Hansgirg (Prodr. Alg. Böhm., II, S. 43) darauf aufmerksam gemacht, dass Crouan (Florule de Finistère, p. 117) *Gloeotrichia* mit *Rivularia* (Rabenh.) Ag. vereinigt hat, während Wolle (Algae of the United States, p. 248) auf Grund seiner Beobachtungen wieder alle *Rivularia*-Arten zur Gattung *Gloeotrichia* ziehen möchte. Es dürfte meiner Meinung nach indess mit Rücksicht auf die Monographie von Bornet und Flahault am zweckmässigsten sein, die Gattung *Gloeotrichia* aufrecht zu erhalten, wenigstens insoweit, als vergleichend entwicklungsgeschichtliche Studien fehlen. Bemerkt sei nur noch, dass Kirchner in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., I, 1a, S. 90 *Gloeotrichia* Ag. als Section zu *Rivularia* stellt.

F. Krasser.

### 634. *Microspora pachyderma*.

Lagerheim, Zur Entwicklungsgeschichte einiger Confervaceen in Ber. d. Deutsch. bot. Ges. (1887), S. 417; De Toni, Syll. Alg., I, p. 227; Hansg., Prodr. Alg. Böhm., II, p. 222. — *Conferva pachyderma* Wille, Algol. Mitth. in Pringsh. Jahrb., XVIII (1887), S. 466, tab. 17, fig. 57—63.

Hungaria: in fossis ad »Római fürdő« prope Budapest, m. Jun.

leg. F. Filárszky.

### 635. *Trentepohlia radicans*.

G. de Beck n. sp.

Corticola, suaveolens hispida. Fila articulata, partem repentia, plus minus furcatim ramosa, cellulis 19—30  $\mu$  crassis duplo vel ter longioribus, partim erecta elongata, plurimum simplicia rarius ramosa longissime attenuata, apice subpilifera, omnes rhizinafera.

Rhizine plurimum in media parte filorum erectorum rarius in filis repentibus et cellulis pluribus aequantibus separatim ortae, articulae, simplices vel frequentius subfasciculatim ramosae; ramuli earum acuminati pluricellulares, cellulis ad 12.3  $\mu$  crassis, inferiores saepe iterum breviter ramosi.

Zoosporangia plurimum sessilia, globosa vel subglobosa, crasse membranacea, 37—50 rarius 60  $\mu$  longa, singula, lateraliter orta rarius terminalia, ibi bina et urceolata.

India orientalis: Mahabuleshwar ad corticem arborum juxta lacum, m. Oct.

leg. A. Hansgirg.

### 636. *Cladophora Sauteri*.

Kütz., Spec. Alg. (1849), p. 414; De Toni, Syll. Alg., I, p. 342. — *Cladophora Aegagropila* f. *Sauteri* Rabenh., Fl. Europ. Alg., III (1868), S. 344. — *Aegagropila Sauteri* Kütz., Phyc. gen. (1843), p. 273; Phyc. germ. (1845), p. 219; Tab. phyc., IV (1854), tab. 61. — *Conferva Aegagropila* L.? certe *Smithii* in Engl. Bot., vol. XX, tab. 1377; Sauter in Flora, VII, 1 (1824), p. 213. — *Conferva coactilis* Sauter apud Nees von Esenbeck in Flora, VII, 1 (1824), p. 275. — *Conferva Sauteri* Nees ex Kützing, Phyc. gen., p. 273. — Zur Entwicklungsgeschichte und Biologie: v. Lorenz sen., Die

Stratotomie von *Aegagropila Sauteri*, Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss., math.-nat. Cl., Bd. X (1855), S. 147; Ergänzungen zur Bildungsgeschichte der sogenannten »Seeknödel« (*Aegagropila Sauteri* Kg.), Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1901, S. 363; F. R. Kjellman, Zur Anatomie und Systematik der Aegagropilen, Nova act. reg. soc. scient. Upsal., ser. III, t. XVII, 2. sect., II (1898), p. 1.

Salisburgia: in lacu »Zeller-See«, solo 8—10 m profundo, m. Oct.

leg. J. R. Lorenz et F. Krasser.

Mit Rücksicht auf den derzeitigen Stand der *Cladophora*-Systematik scheint es mir namentlich in Exsiccatenwerken geboten, von der üblichen Nomenclatur nicht abzuweichen, was allerdings eine Erörterung der Nomenclaturfrage nicht ausschliesst. Diese Erörterung ist auch deshalb geboten, weil De Tonis Sylloge irrig nomenclatorische Angaben über die in Rede stehende Alge enthält.

Aus der Synonymie geht hervor, dass als Prioritätsname für *Cladophora Sauteri* gewählt werden muss: *Cladophora coactilis* (Sauter). Schon Nees hat l. c., p. 276 bedingungsweise die Gattung *Aegagropila* aufgestellt, so dass für den Fall der Annahme dieser Gattung als Prioritätsname *Aegagropila coactilis* (Sauter) Nees zu gelten hat. Die Artbezeichnung *Sauteri* geht auf eine von Nees vorgenommene Umtaufung zurück, welche in schedulis erfolgte und von Kützing aufgenommen wurde.

Die *Cladophora Sauteri* hat seit jeher das Interesse der Forscher und der Naturfreunde auf sich gezogen, trotzdem sind wir weder über ihre Entwicklungsgeschichte noch über ihren systematischen Wert genau unterrichtet. Fast alle Feststellungen über die Biologie der *Cladophora* (*Aegagropila*) *Sauteri* verdanken wir den oben citierten Untersuchungen von J. R. Ritter Lorenz v. Liburnau sen.

Das hier ausgegebene Exsiccacat ist eine der Entwicklungsformen der »Seeknödel«, wie sie von v. Lorenz als »Zäpfchen«, »Plättchen«, »Knödelbrut« u. s. w. bezeichnet werden. Die typischen Knödelformen, die »Seeknödel«, unter welchem Namen diese Alge populär geworden ist, werden gegenwärtig nicht mehr gefunden. Sie waren auf eine ufernahe Zone mit sehr mildem, leicht beweglichem Thon- und Glimmerboden beschränkt. Diese in der südwestlichen Ecke des Sees gelegene seichtere Littoralzone ist heute aufgeschüttet, sie war von den Fischern als Landungsplatz bevorzugt und als Ort, an welchem sie vom Fischzuge zurückkehrend die Netze hoben, um die Beute in Sicherheit zu bringen und die im tiefen See mitgefischten *Cladophoren* wieder abzustossen. Hier erst entwickelten sie sich unter dem Einflusse der intensiveren Belichtung, begünstigt durch die Wellenbewegung, zu den mehr minder kugelförmigen »Seeknödeln«, die, wie z. B. Simony (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1852, S. 98) angibt, in der Regel  $\frac{1}{2}$ —5 Zoll (= 7—132 mm) im Durchmesser erreichen können. Simony fand in der erwähnten Littoralzone im August die Temperatur zwischen 16.5—17° R. und sagt, dass sie kaum je 18° übersteigen dürfte. Da der See regelmässig alljährlich zufriert, so haben die Seeknödel eine Temperaturschwankung von 0—18° R. zu bestehen. Der See ist starken Nordwinden ausgesetzt, die bis 2 Fuss hohe Wellen erzeugen. Erst in jüngster Zeit wurde, und zwar von v. Lorenz, festgestellt, dass die *Cl. Sauteri* die grösste zusammenhängende Verbreitung in Tiefen von 8—10 m hat, und zwar an zwei Stellen längs des westlichen Ufers und einer längs des östlichen. In diesen Tiefen finden sich die festsitzenden und auch fluctuierenden Formen, glomera der verschiedensten Gestalten, unter ihnen häufig kleine rundliche Bällchen (»Knödelbrut«). Namentlich aus den letzteren gehen, wenn sie in die seichte Uferzone gelangen, unter den bereits angegebenen günstigen localen Wachstumsverhältnissen die »Seeknödel« hervor.



Namentlich durch die *Cladophora*-Studien von Brand (Bot. Centralbl., Bd. 79, 1879) wurden die Schwierigkeiten offenbar, die einer natürlichen Systematik der Cladophoren gegenüberstehen. Speziell vergleichende Studien über Arten der Section *Aegagropila* sind so gut wie nicht betrieben worden. Es ist daher schwer zu beurtheilen, ob die von den verschiedenen Autoren als unterscheidend angegebenen Merkmale stichhältig sind. Insolange nicht die Entwicklungsgeschichte und die Biologie des ganzen Formenkreises genauer bekannt sind, kann die derzeit übliche Artumgrenzung nur als eine provisorische gelten, insolange liegt aber auch kein Grund vor, insbesondere die *Cladophora (Aegagropila) Sauteri* aus dem Zellersee nicht als Art zu betrachten. Die von Kützing, Tab. phyc., tab. 67 gegebene Abbildung ist im wesentlichen zutreffend. Durch die Untersuchungen von Kjellman wurde der Nachweis erbracht, dass alle echten Aegagropilen Coenobien sind. *Cladophora (Aegagropila) Sauteri* besteht aus gleichartigen Einzelpflanzen ohne Basalkörper von gonidialer Natur. Die Einzelpflanzen sind im Coenobium mehr minder strahlig angeordnet. Die Neubildung der Individuen scheint auf Absonderung und Individualisierung von Zweigen zu beruhen. Dies geht sowohl aus den Untersuchungen von v. Lorenz (1855), wie aus der Arbeit von Kjellman (1898) hervor.

F. Krasser.

### 637. *Vaucheria dichotoma*.

Ag., Syn. Alg. Scand. (1817), p. 47; Rabenh., Kryptfl. v. Sachs., I, S. 224; Fl. Europ. Alg., III, S. 268; Kirchn. in Cohn, Kryptfl. v. Schles., II, 1, S. 82; Hansg., Prodr. Algfl. Böhm., I, p. 96; De Toni, Syll. Alg., I, p. 395. — *Vaucheria pyriformis* Kütz., Phycol. gen., p. 305; Tab. phyc., VI, tab. 56. — *Vaucheria globifera* De Bary in Monatsbl. Akad. Berlin (1856), S. 589. — *Conferva dichotoma* L., Spec. plant. (1753), p. 1165.

Hungaria: Budapest ad Aquincum in aquis stagnantibus et in aqua lente fluente fossarum, caespites permagnos, longe lateque expansos, velutinos formans, m. Jun.

Filárszky beobachtete die am Fundorte kräftig vegetierende Alge mehrere Jahre, konnte jedoch niemals Oogonien und Antheridien finden. leg. Filárszky.

### 638. *Cosmarium nitidulum*.

De Not., Elementi per lo studio delle Desmidiacee Italiane (1867), p. 42, tab. III, fig. 26; Rabenh., Fl. Europ. Alg., III, S. 169; Nordst., Desm. Brasil., p. 211; Desm. Italiane, tab. 12, fig. 10; De Toni, Syll. Alg., I, p. 935; Nordst., Ind. Desm., p. 181.

India orient. (Bombay): in aqua stagnanti aquaeductus leg. A. Hansgirg.

Inest: *Scenedesmus quadricauda* Bréb., Alg. Falais. in Mém. Soc. Akad. de Française Bot. (1835), p. 66; Ralfs, Brit. Desm., p. 190, tab. XXXI, fig. 12; De Toni, Syll. Alg., I, p. 565. — *Scenedesmus caudatus* Corda in Almanach de Carlsb. (1834); Wolle, Freshw. Alg. U. S., p. 172, tab. 56, fig. 11, 12; Kirchn. in Cohn, Kryptfl. v. Schles., II, 1, S. 98. — *Arthrodesmus quadricaudatus* Ehrenb., Inf., S. 150, nr. 173 excl. syn. plur. — *Achnanthes quadricauda* Turp. (1820). Die sonstigen Beimengungen sind ganz untergeordnet.

Die vorliegende Form des *Cosmarium nitidulum* weicht vom Typus durch den schmäleren, flach abgerundeten und mitten meist etwas eingedrückten Scheitel und durch die schmal-lineare, nach aussen nicht erweiterte Mitteleinschnürung ab. Besser stimmt in der Frontalansicht die Abbildung des *C. nitidulum* von Nordstedt: »Desm. Ital., tab. 12, fig. 10« überein, doch fehlt bei letzterer die leichte Einbiegung in der Mitte des Scheitels, auch bildet Nordstedt die Scheitelansicht elliptisch ohne Mittelschwellung ab. Ähnlichkeit hat auch *C. phaseolus* β. *elevatum* Nordst., Syll.,

Norg. Desm., p. 17, tab. 1, fig. 5 zeigt aber in der Scheitelansicht eine stärker ausgesprochene, fast spitzige Mittelanschwellung.

Endlich hat noch *C. trafilgaricum* Wittrock (Wittr. et Nordst., Alg. exsicc., fasc. XXI, Schedae, p. 44 c. icone) einige Aehnlichkeit, doch ist bei letzterem die Scheiteldepression stärker, der Sinus nach aussen erweitert, die Mittelanschwellung schärfer ausgeprägt.

Jede Zellhälfte des ausgegebenen *C. nitidulum* enthält ein Pyrenoid. Die Massverhältnisse sind: Long. = 24—28  $\mu$ , lat. = 17—22  $\mu$ , l. isthm. = 6  $\mu$ , crass. = 11—12  $\mu$ .  
F. Krasser.

### 639. *Staurastrum furcatum*.

Brébisson, Liste des Desmid. Basse-Normandie in Mém. soc. imp. scienc. nat. Cherbourg, vol. IV (1856), p. 135; Rabenh., Kryptfl. v. Sachs., S. 194; Fl. Europ. Alg., III, S. 218; Kirchn. in Cohn, Kryptfl. v. Schles., II, 1, S. 146; Cooke, Brit. Desm., p. 146, tab. 51, fig. 1; Hansg., Prodr. Alg. Böhm., I, p. 215; De Toni, Syll. Alg., I, pag. 1153. — *Xanthidium furcatum* Ehrenb., Organ. kl. Raum. (1834), p. 318; Infus., p. 148, tab. 10, fig. XXV; Meteorpap., p. 56, tab. 1, fig. 21. — *Asteroxanthium furcatum* Kütz., Spec. Alg. (1849), p. 183.

#### f. *spinosa*.

Nordst. in Wittr. et Nordst., Alg. exsicc., nr. 165 (1878); Ind. Desm., p. 127; Kirchn. in Cohn, Kryptfl. v. Schles., II, 1, S. 170. — *Staurastrum furcatum* var. f. Rabenh., Fl. Europ. Alg., III (1868). — *Staurastrum spinosum* Ralfs, Brit. Desm. (1848), p. 143, tab. 22, fig. 8; Pritch., Inf., p. 268; De Bary, Conjug., p. 44; Reinsch in Rabenh., Alg. Europ., nr. 1899, fig. 4—5.

### *Cosmarium pygmaeum*.

Archer in Quart. Journ. Micr. Soc., IV (1864), p. 174, tab. 6, fig. 45—49; Cooke, Brit. Desm., p. 91, tab. 37, fig. 8; De Toni, Syll. Alg., I, p. 1046. — *Sphaerosma pygmaeum* Rabenh., Fl. Europ. Alg., III, p. 150; De Toni, Syll. Alg., I, p. 793 ex errore.

Bohemia: in turfosis prati »Wolfsgruber Au« dicti prope »Eleonorenhain« in territorio »Böhmerwald«, m. Aug.

leg. J. Lütkenmüller.

Beide Algen sind für Böhmen neu.

### 640. *Melosira arenaria*.

Moore in Ralfs, Ann. Nat. hist., XII (1844), tab. IX, fig. 4; Kütz., Bacill., p. 55, tab. 21, fig. XXVII; Rabenh., Süßwasser-Diatom., tab. II, fig. 5; Fl. Europ. Alg., I, p. 42; Van Heurck, Synops., p. 200, tab. XC, fig. 1—3; De Toni, Syll. Alg., II, p. 1338; Van Heurck, Traité des Diatom., p. 443, fig. 168 (p. 439) et tab. 19, fig. 621. — *Orthosira arenaria* W. Sm., Syn. Brit. Diatom., II (1856), p. 59, tab. LII, fig. 334. — Zur Entwicklungsgeschichte vergleiche: O. Müller in Pringsh. Jahrb., XIV (1883), p. 231 squ., tab. XIV—XVIII.

Cum auxosporis!

Hungaria: inter *Cladophoram fractam* (formam ramis carentem) et *Vaucheriae* speciem sterilem in aqua stagnante ad Loretto, m. Jun.

leg. S. Stockmayer.

### 641. *Dictyota dichotoma*.

Lamour. in Journ. de Bot. (1809), t. II, p. 42; Ag., Spec. Alg., I, p. 92; Kütz., Spec. Alg., p. 554; Hauck, Meeresalgen, S. 304; De Toni, Syll. Alg., III, p. 263. —



*Dictyota vulgaris* Kütz., Spec. Alg., p. 553; Tab. phyc., IX, tab. 10. — *Dictyota attenuata* et *elongata* ibid., p. 6, tab. 11. — *Dictyota latifolia* ibid., p. 6, tab. 12; Reinke, Entwicklungsgeschichtl. Unters. über die Dictyotaceen d. Golf. v. Neapel, Nova Act. Leop.-Carol., XL (1878).

### f. implexa.

Hauck, Meeresalgen (1884), S. 306; De Toni, Syll. Alg., III, p. 264. — *Dictyota dichotoma* var. *implexa* Ag., Spec. Alg., I (1821), p. 92. — *Dictyota implexa* Lamour., Dictionn., p. 14; Kütz., Spec. Alg., p. 555; Tab. phyc., IX, tab. 14.

Mare adriaticum: in sinu tergestino

leg. F. Krasser.

### 642. Zanardinia collaris.

Crouan in Bull. soc. bot. Fr. (1857), p. 24; Hauck, Meeresalgen, S. 408; Ardissonne, Phyc. mediterr., II, p. 56; De Toni, Syll. Alg., III, p. 305. — *Zanardinia Prototypus* Nardo in Atti 2. riun. scienc. ital. in Torino (1841), p. 189. — *Zonaria collaris* Ag., Spec. Alg., I (1821), p. 127; J. Ag., Spec. Alg., I, p. 107; Kütz., Spec. Alg., p. 565 nec Tab. phyc., IX, tab. 76! — *Spatoglossum Spanneri* Menegh. et *Sp. flabelliforme* Kütz. in Kützing, Spec. Alg., p. 560; Kütz., Tab. phyc., IX, tab. 47. — *Padina collaris* Grev. in Menegh., Alghe ital., p. 245. — *Peyssonelia umbilicata* Kütz., Tab. phyc., XIX, p. 32, tab. 89. — Entwicklungsgeschichte: Reinke, Entwicklungsgeschichtl. Unters. über die Cutleriaceen d. Golf. v. Neapel, Nova Act. Leop.-Carol., XL (1878).

Mare adriaticum: ad lapides et molluscos »Pinna« dictos in sinu tergestino, m. Apr.

leg. F. Krasser.

### 643. Batrachospermum sporulans.

Sirodot, Les Batrachospermes (1884), p. 216, tab. XI, fig. 1—15; De Toni, Syll. Alg., IV, 1, p. 52. — *Batrachospermum moniliforme* var. *pulcherrimum* (Bory) Kütz., Spec., p. 535; Rabenh., Fl. Europ. Alg., III, p. 405. — *Batrachospermum ludibundum* var. *pulcherrimum* Bory in Ann. du Muséum, XII, tab. 30, fig. 2.

Austria inferior: in aqua fere stagnante (lentissime fluente) prope domum Schmeisslmühle ad Frankenfels 400 m s. m., m. Maio

leg. S. Stockmayer.

### 644. Wrangelia penicillata.

Ag., Spec. Alg., vol. II (1828), p. 143; J. Ag., Spec. Alg., II, p. 708 et III, p. 623; Kütz., Spec. Alg., p. 664; Tab. phyc., XII, tab. 40; Born. et Thur., Notes algol., p. 183, tab. 48; Hauck, Meeresalgen, S. 53; De Toni, Syll. Alg., IV, 1, p. 135. — *Griffithsia penicillata* Ag., Syst. Alg. (1824), p. 143. — *Wrangelia tenera* Ag., Spec. Alg., II, p. 737. — *Wrangelia verticillata* Kütz., Spec. Alg., p. 664; Tab. phyc., XII, tab. 39.

Mare adriaticum: in sinu tergestino

leg. F. Krasser.

### 645. Nitophyllum ocellatum.

Grev., Alg. brit. (1830), p. 78. — *Fucus ocellatus* Lamour., Dissert. sur plusieurs espèces de Fucus peu connues ou nouvelles (Agen 1805), tab. 32. — *Aglaophyllum ocellatum* Kütz., Spec. Alg., p. 867; Tab. phyc., XVI, tab. 35. — *Aglaophyllum delicatulum* Kütz., Spec. Alg., p. 868; Tab. phyc., XVI, tab. 35. — *Nitophyllum punctatum* α) *ocellatum* J. Ag., Spec. Alg., II, p. 659 et III, p. 448; Hauck, Meeresalgen, S. 170; De Toni, Syll. Alg., IV, 2, p. 627.

Cum tetrasporis.

Mare adriaticum: in pontu tergestino ad vallum »Tiga«

leg. F. Krasser.

646. *Vidalia volubilis*.

J. Ag., Spec. Alg., II, 3 (1863), p. 1121; Hauck, Meeresalgen, S. 250; Falkenberg in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., I, 2, S. 467; Falkenberg, Die Rhodomelaceen in Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 26. Monogr., Berlin 1901, S. 424 sequ. et tab. 7, fig. 8—17. — *Fucus volubilis* L., Spec. plant., II, ed. II (1763), p. 1627. — *Dictyomenia volubilis* Grev. sec. Kütz., Spec. Alg., p. 847; Kütz., Tab. phyc., tab. 98. — *Volubilaria mediterranea* Lamour. in Dict. class., V (1824), p. 387.

Mare adriaticum: ad saxa prope Rovigno, m. Nov.

Comm. F. Krasser et J. de Lorenz sen.

Erst in jüngster Zeit hat J. R. Ritter Lorenz v. Liburnau sen. (Denkschr. d. kais. Akademie d. Wiss. Wien, math.-nat. Cl., LXX, 1900) in einer Abhandlung, welche sich mit der »Deutung der fossilen Fucoidengattungen *Taenidium* und *Gyrophyllites*« beschäftigt, auch eine Reihe von Beobachtungen über *Vidalia volubilis* mitgeteilt, die sowohl in biologischer, als auch in systematischer Beziehung von Interesse sind. v. Lorenz lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass im Quarnero die im Spätsommer und im Herbste gesammelten Exemplare einen anderen Typus zeigen als die im Erstfrühling vorkommenden. Die Frühlingsform besitzt eine Lamina, deren beide Seitenränder frei abstehen, obgleich sie sich gewöhnlich ein wenig nach oben aufrichten. Kützing hat eine forma *expansa* beschrieben, die offenbar auf diese Vegetationsform zu beziehen ist. Die im Spätsommer und im Herbste auftretende Form wird von v. Lorenz (l. c., p. 29 [551]) als *involuta* bezeichnet. Sie ist durch den Besitz einer gerollten Lamina ausgezeichnet. Mit der fortschreitenden Umwandlung der forma *expansa* in die forma *involuta* wird die Lamina immer stärker und fast ledrig, und es schrumpfen die zarteren Zähne der Ränder immer mehr ein, auch die Umgänge rücken näher aneinander, so dass auch die Schraube flacher wird und die einzelnen Umgänge beinahe wagrecht liegen. Die Einrollung geht nach v. Lorenz und meinen Beobachtungen oft so weit, dass zuletzt zwei oder auch drei Umwicklungen entstehen. Im Erstfrühling fand v. Lorenz nur circa 10% *involuta*, im November fast 90%.

In nomenclatorischer Beziehung sei bemerkt, dass *Volubilaria* Lamour. (1824), seit ihn J. Agardh (Spec. Alg., II, p. 1120) als »non bene sonans« fallen liess, nicht mehr aufgenommen wurde, so dass er umsomehr als »verjährt« gelten kann, als durch die entwicklungsgeschichtlichen und morphologischen Untersuchungen von Falkenberg die *Vidalia*-Arten als eine systematische Einheit erwiesen wurden.

F. Krasser.

647. *Rhodochorton floridulum*.

Naegeli, Beitr. z. Morph. u. System. d. *Ceramiceae* in Sitzungsber. Akad. Wiss. München (1861), S. 358; Hauck, Meeresalg. Deutschl. u. Oesterr., S. 521. — *Conferva floridula* Dillw., Conf. Syn., pag. 73, tab. suppl. F. — *Callithamnion floridulum* Ag., Spec. Alg., p. 188; Harv., Phyc. brit., tab. 120 A; Kütz., Spec. Alg., p. 640; Tab. phyc., XI, tab. 60; J. Ag., Spec. Alg., II, p. 19; III, p. 13. — *Thamnidium floridulum* Thur. in Le Jol., Alg. marin. Cherb., p. 111, tab. 6.

Cum tetrasporis.

Insula Helgoland: ad saxa emmergens, m. Nov.

leg. P. Kuckuck.

648. *Antithamnion crispum*.

Thur. apud Le Jol., Liste des Algues marines de Cherbourg (Paris 1863), p. 112. *Antithamnion plumula* β. *crispum* Hauck, Meeresalg. Deutschl. u. Oesterr., S. 73. —



*Ceramium crispum* Ducluzeau, Essai sur l'histoire naturelle des conferves des environs de Montpellier (Montpellier 1809), p. 47. — *Callithamnion plumula*  $\beta$ . *crispum* J. Ag., Spec. Alg., II, p. 20 et III, p. 24. — *Callithamnion polyacanthum* Kütz., Spec. Alg., p. 648; Tab. phyc., XI, tab. 83, fig. II. — *Callithamnion refractum* Kütz., Spec. Alg., p. 650; Tab. phyc., XI, tab. 84, fig. I. — *Callithamnion macropterum* Menegh. in Kütz., Spec. Alg., p. 650.

**Mare adriaticum: in sinu tergestino, m. Apr.**

leg. F. Krasser.

Vom *Antithamnion plumula* (Ellis) Thuret (= *A. plumula*  $\alpha$ . *genuinum* Hauck), welches in der Adria nicht vorkommt, ist *A. crispum* sehr scharf und auffällig durch die wirtelig vierzeiligen, gespreizten und zurückgebogenen Aestchen mit dornartigen Fiederchen unterschieden. Die von Hauck, l. c., p. 70 mitgetheilte Figur entspricht dem *C. refractum* Kütz., Tab. phyc., XI, fig. 1 auf tab. 84, während die von mir ausgegebenen Exemplare genau mit *C. polyacanthum* Kütz., Tab. phyc., XI, fig. II auf tab. 83 entsprechen. Uebergänge habe ich nicht beobachtet. Die dornartigen Fiederchen sind unter allen von den Autoren unter *A. crispum* subsummierten Formen nur bei *C. polyacanthum* Kütz. prägnant ausgebildet, bei den übrigen tritt der dornartige Charakter der Fiederchen weitaus weniger hervor.

F. Krasser.

#### 649. *Ulvella radians*.

Schmidle, Algol. Notizen XIII in Allg. botan. Zeitschr., V (1899), S. 57. — *Dermatophyton radians* Peter, Ueber eine auf Thieren schmarotzende Alge, 59. Vers. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 21. Sept. 1886; Botan. Centralbl., XXVIII (1886), S. 125. — *Dermatophyton radicans* De Toni, Syll. Alg., I, p. 149; Wille in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., I, 2, S. 104. — *Epiclemydia lusitanica* Potter in Proc. Cambridge Phil. Soc., vol. VI, 1 (8. Nov. 1886); Note on an Alga (*Dermatophyton radicans* Peter) growing on the European Tortoise in Linn. Soc. Journ. Bot., vol. XXIV, p. 251, tab. 8.

**Conspectus anatomicus.**

**Marokko: ad dorsum clypeorum Chlamydis leprosaе**

leg. Hintz, comm. et praepr. F. Pfeiffer de Wellheim.

**Präparation:** Formol, Kernschwarzfärbung, venetianischer Terpentin.

Die Präparate sind Celloidinschnitte durch Alge und Schildkrotschale. Herr F. v. Pfeiffer fertigte die Schnitte aus Material, welches ihm W. Schmidle überlassen hatte. Die oben citierte Arbeit Schmidles beruht, was die histologischen und zellmorphologischen Verhältnisse anbelangt, auf Präparaten Pfeiffers v. Wellheim (Schmidle, l. c., p. 40). Die hier ausgegebenen Präparate sind also als Belege für die Resultate der Schmidle'schen Untersuchung von *Dermatophyton radians* anzusehen, sie enthalten je einen Quer- und einen Flächenschnitt. Bemerkenswert ist der verhältnismässig dicke Chromatophor mit ausgesprochen wabigem Bau; Pyrenoide fehlen. In dem vom Chromatophor umschlossenen Hohlraum befindet sich Protoplasma, welches in ziemlich breiten Strängen die in Mehrzahl vorhandenen Kerne verbindet, respective umlagert. Die Kerne selbst sind ziemlich gross und enthalten meist mehrere Nucleolen. Besonders reich an Kernen erscheinen an Querschnitten die obersten Zellen, die sich in Sporangien umwandeln. Der Thallus ist, wie Schmidle festgestellt hat, in der Mitte mehrschichtig, am Rande einschichtig. In nomenclatorischer Beziehung sei bemerkt, dass kein Grund vorliegt, die *Ulvla involvens* Savi [apud T. Salvadori, Catal. uccelli di Sardegna (1864), p. 118] mit *Ulvella radians* in Verbindung zu bringen, wie dies Schmidle, l. c., p. 57, Anm. 5 unter Berufung auf De Toni, Syll. Alg., I, p. 149 versucht. De Toni sagt ausdrücklich: Ex speciminum authentic. *Ulvae involventris* Savi

benevole a cl. prof. Thom. Salvadori mihi missorum at nimis obsoleto-  
rum observatione, dubium manet utrum haec *Ulvae* species (ad plumas *Phalacrocoracis* ex  
avium familia vicens) identica sit cum *Dermatophyto radicante* Peter. F. Krasser.

### 650. *Xanthidium armatum*.

Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., II, 2 (1847), S. 55; Bréb. in Ralfs, Brit. Desm.  
(1848), p. 112, tab. 18; De Toni, Syll. Alg., I, p. 916; Nordst., Ind. Desm., p. 51. —  
*Xanthidium furcatum* Ralfs in Ann. and Mag. of Nat. hist. (1844), p. 466, tab. XII, fig. 1  
excl. syn. — *Euastrum armatum* Kütz., Phyc. germ., p. 137.

Conspectus anatomicus imprimis respectu »Porenorgane«.

**Suecia:** in stagnis turfosis apud Marstrand

leg. O. Nordstedt, comm. et praep. F. Pfeiffer de Wellheim.

Präparation: Chromessigsäure, Kernschwarz-Magdalaroth, venetian. Terpent. in.

## Addenda:

### 71, b. *Nostoc verrucosum*.

Vauch.

**Austria inferior:** Loich prope Kirchberg a. d. Pielach leg. S. Stockmayer.

### 222, b. *Nostoc commune*.

Vauch.

**Austria inferior:** Schwarzbach a. d. Pielach leg. S. Stockmayer.

## Lichenes (Decades 19—20).

### 651. *Arthopyrenia Arnoldi*.

A. Zahlbr. n. sp.

Thallus tenuissimus, epiphloeodes, continuus, submembranaceus, effusus, albidus,  
KHo demum sordescens, Ca Cl—. Gonidia copiosa, protococcoidea (globosa et laete  
viridia). Apothecia dispersa, primum thallo tecta et cinerascens, demum nuda, nigra,  
nitidiuscula, minuta (0.18—0.25 mm lata), semiglobosa vel depressa, perithecio fuliginco  
dimidiato que, poro primum punctiformi (17—20  $\mu$  lato), demum sub lente bene conspi-  
cua; paraphyses distinctae, laxe ramoso-connexae, tenuies, eseptatae; asci ovali-oblongi,  
basi breviter, sed distincte pedicellati, 58—64  $\mu$  longi et 10—14  $\mu$  lati, apice membrana  
incrassata, 4—8 spori, I vinose lutescentes; sporae biloculares, hyalinae, ellipsoideae vel  
oblongo-ovales, recte vel leviter curvatae, loculis fere aequalibus, medio non constrictae,  
halone sat lata primum circumdatae, 14—16  $\mu$  longae et 5—8  $\mu$  latae. Conceptacula  
pycnoconidiorum punctiformia, nigra; pycnoconidia bacillaria, recta, 3.5—4  $\mu$  longa et  
0.5  $\mu$  lata.

**Tirolia:** ad ramulos *Laricum* prope Sct. Ulrich (Gröden)

leg. A. Zahlbruckner.

Die vorliegende Art ist durch das constant epiphloeodische, Pleurococcus-Gonidien  
führende Lager, durch die kleinen Früchte, durch die deutlichen, netzartig verbundenen  
Paraphysen und die zweizelligen Sporen, deren Fächer nahezu gleich gross sind,



charakterisiert. An den zahlreichen für diese Exsiccaten gesammelten Stücken fand ich den Thallus stets in der beschriebenen Form ausgebildet und bei Prüfung der Schnitte unter dem Mikroskope keine Anhaltspunkte dafür, dass das Lager einer anderen Flechte angehören könne. Ich konnte daher schon mit Rücksicht auf die thallodischen Verhältnisse die Pflanze mit keiner der bekannten Arthopyrenien identificieren. Auch sonst geben der innere Bau der Perithezien und die Grösse der einzelnen Theile, wie auch die Form der Pycnoconidien ein Gesamtbild, welches auf keine der Arten aus der Gruppe der *Arthopyrenia cinereopruinosa* (Schaer.), wohin die vorliegende Species gehört, vollkommen passt.

## 652. *Dermatocarpon aquaticum*.

A. Zahlbr. — *Lichen aquaticus* Weiss, Pl. Crypt. Fl. Goetting. (1770), p. 77. — *Platisma aquaticum* Hoffm., Pl. Lichen., II (1794), p. 89, tab. 45, fig. 1—5. — *Endocarpon minutum* ? *aquaticum* Schaer., Lich. Helvet. Spicil., sect. II (1826), p. 60 et Enum. Lich. Europ. (1850), p. 232. — *Lichen fluviatilis* Web., Spicil. Fl. Goetting. (1778), p. 265. — *Endocarpon fluviatile* DC., Fl. franç., II (1805), p. 413; Wahlb., Fl. Lapp. (1812), S. 462; Koerb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 101; Nyl., Lich. Scand. (1861), p. 265; Arn. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV (1874), Abh., S. 249. — *Dermatocarpon fluviatile* Th. Fries, Lich. Arctoi (1860), p. 254. — *Lichen Weberi* Ach., Lichgr. Suec. Prodr. (1798), p. 142.

Tirolia: ad saxa inundata rivuli Tumpnerbach inter Oetz et Umhausen

leg. A. Willi.

Der älteste Name für die obige Flechte ist zweifellos *Lichen aquaticus* Weis (1770). Wenn Weber acht Jahre später die Flechte *Lichen fluviatilis* benennt, so geschah dies nur mit Rücksicht darauf, dass Linné bereits früher (1753) eine andere Flechte so bezeichnete. Weber hebt diesen Umstand ausdrücklich hervor und musste diese Namensänderung vornehmen, da er mit Linné nur ein einziges Flechtengenus, *Lichen*, kannte. Mit dem Auflösen der Linné'schen Collectivgattung musste der Weis'sche Speciesnamen wieder in seine Rechte treten. Hoffmann und Schaerer restituieren die älteste Benennung, während die meisten der neueren Autoren mit Unrecht die Weber'sche Artbezeichnung in die moderne Gattung herübernahmen. Da ich die Gattung *Dermatocarpon* im Sinne Th. Fries' (Gener. Heterolich., p. 103) umgrenze, dessen berechtigter Anschauung sich auch Wainio (Étud. Lich. Brésil, II, p. 186) anschliesst, so musste ich die hier zur Ausgabe gelangende Flechte mit einer neuen Combination benennen.

## 653. *Dirina Hassei*.

A. Zahlbr. in Bull. Torrey Bot. Club, XXVII (1900), p. 644.

California: ad corticem ramulorum *Rhoidis laurinae* ad ora maris in montibus

Santa Monica

leg. H. E. Hasse.

Thallus epiphloeodes, effusus, continuus, substratum late obtegens, tenuis, ruguloso-rimosus, areolas parvas formans, lutescenti-albidus, opacus, KHO leviter flavescens, KHO et KHO + CaCl non mutatus, in margine linea obscuriore non cinctus. Apothecia parva (0.3—0.7 mm lata) rotunda vel subrotunda, copiosa, dispersa, sessilia primum plana et dense caesio-pruinosa, demum parum convexa, minus pruinosa vel nigricantia, margine thallino integro, albido, persistente cincta; hypothecium fusco-nigrum, sat crassum; hymenium J vinose rubens; asci subcylindrico-saccati vel saccati et subcuneati, 8-spori, 47—54  $\mu$  longi et 8—9  $\mu$  lati; paraphyses filiformes, apice subelavatum in-

crassatae et fuscae; sporae leviter curvulae, fusiformes, apicibus obtusis, hyalinae, 3-septatae, 15—20  $\mu$  longae et 3—4  $\mu$  latae, loculis cylindricis, episporio tenui. Conceptacula pycnoconidiorum minuta, thallo immersa et solum vertice nigro nitidoque prominentia; sterigmata versus basim ramosa, breviter; pycnoconidia minuta, oblonga, apice obtusa, leviter curvula, 3—4  $\mu$  longa et 0.6—0.8  $\mu$  lata.

#### 654. *Dirina rediunta*.

A. Zahlbr. — *Lecanora rediunta* Stzbgr. in Bull. Torrey Bot. Club, XXIV (1897), p. 446. — *Lecidea sublugens* Nyl. apud Hasse, Lich. South. Californ., ed. 2 (1898), p. 14.

Thallus crustaceus, tenuis, epi- et pro parte endophloeodes, rimosus, rugulosus vel sublaevigatus, subnitidus, cretaceoalbidus, KHO leviter flavescens, CaCl—. Gonidia chroolepoidea, cellulis concatenatis, subglobosis vel ovalibus, 8—10  $\mu$  longis, leptodermaticis. Apothecia copiosa, ut plurimum conferta, sessilia, sat parva (ca. 0.5 mm lata), disco atro, dense et persistentia albido-pruinoso, scabrido, demum convexo, margine thallino tenui, acuto, subintegro persistenteque; epithecium pulverulentum, crassiusculum, nigrescens KHO et NO<sub>3</sub> non mutatum; hypothecium fusco-nigrum, in marvinem lateraliter non adscendens; hymenium dilute fuscescens, 100—120  $\mu$  altum, J ginose rubescens; paraphyses pertenues, conglutinatae, simplices et eseptatae; asci oblongo-clavatae, 70—80  $\mu$  longi et 18—22  $\mu$  lati, 8-sporei; sporae fusiformes, leviter curvatae, 3-septatae, loculis cylindricis, hyalinae, demum saepe leviter fusciscentes, subbiseriatis in ascis dispositae, 22—25  $\mu$  longae et 4—5  $\mu$  latae. Conceptacula pycnoconidiorum punctiformia, nigricantia; sterigmata breviter, ramosa; pycnoconidia terminalia, arcuata, 8—9  $\mu$  longa et circa 1.5  $\mu$  lata.

California: ad corticem *Juglandis californicae* in montibus Santa Monica

leg. H. E. Hasse.

Für die Zugehörigkeit unserer Pflanze sprechen die Chroolepus-Gonidien, der dunkle Schlauchboden und die Form der Sporen so augenfällig, dass es mir recht unerklärlich erscheint, wie so gewiegte Kenner der Lichenen wie Nylander und Stizenberger, die richtige Stellung dieser Art nicht erkannten. Von der zweiten rindenbewohnenden *Dirina* Californiens, welche unter Nr. 653 zur Ausgabe gelangt, weicht die vorliegende Art durch ihren Habitus, durch den inneren Bau der Apothecien, durch die Grösse der Sporen und die Form der Pycnoconidien wesentlich ab.

#### 655. *Secoliga gyalectoides*.

Mass., Descriz. alc. lich. (1857), p. 20; Körb., Parerg. Lich. (1859), p. 110; Arn. in Flora (1884), p. 413. — *Thelotrema gyalectoides* Mass., Recherch. sull'auton. (1852), p. 142, fig. 279. — *Lecidea thelotremoides* Nyl. in Act. Soc. Linn. Bordeaux, XXI (1856), p. 348. — *Gyalecta thelotremoides* Jatta, Syll. Lich. Ital. (1900), p. 302.

Wurtemberg: ad saxa dolomitica in valle »Wendthal« prope Heidenheim

leg. F. X. Rieber.

#### 656. *Bilimbia obscurata*.

Th. Fries, Lich. Arctoi (1860), p. 182 ( $\alpha$ ) et Lichgr. Scand., I (1874), p. 373; Arn. in Flora (1884), p. 570; Oliv., Expos. syst. Lich. Ouest, II (1900), p. 33. — *Lecidea sphaeroides*  $\beta$ ) *obscurata* Smrft., Suppl. (1826), p. 165 (excl. syn.). — *Lecidea sabuletorum* var. *obscurata* Stzbgr., Lecid. sabul. (1867), p. 33, tab. II, fig. 37—52.

Litorale austriacum; supra muscos destructos in agro tergestino

leg. J. Schuler.



**657. Bilimbia coprodes.**

Körb., Parerg. Lich. (1859), p. 166; Arn. in Flora (1884), p. 575. — *Bilimbia coprodes* α) *normalis* Th. Fries, Lichgr. Scand., I (1874), p. 385. — *Lecidea trachona* var. *coprodes* Stzbgr., Lecid. sabul. (1867), p. 60, tab. III, fig. 14—17. — *Lecidea coprodes* Wainio in Medd. Soc. faun. et flor. fennic. (1883), p. 12. — *Patellaria generensis* Müll. Arg., Princip. Classif. Lich. Gen. (1862), p. 60, tab. I, fig. 5.

Austria inferior: ad saxa umbrosa calcarea in monte Sonntagberg prope Rosenau  
leg. P. P. Strasser.

**658. Bilimbia ligniaria.**

Arn. in Flora (1884), p. 572 et Lichfl. München (1891), p. 86. — *Lecidea ligniaria* Ach. in Vet. Akad. Handl. (1808), p. 236; Wainio in Medd. Soc. faun. et flor. fennic. (1883), p. 11. — *Bilimbia milliaria* α) *ligniaria* Th. Fries, Lichgr. Scand., I (1874), p. 382; Oliv., Expos. syst. Lich. Ouest, II (1900), p. 37. — *Lecidea sabuletorum* var. *miliaria* Stzbgr., Lecid. sabul. (1867), p. 44, tab. III A, fig. 7—26; ubi syn.). — *Bilimbia syncomista* Körb., Parerg. Lich. (1859), p. 170.

Austria inferior: ad scandulas vetustas in monte Sonntagberg prope Rosenau  
leg. P. P. Strasser.

**659. Lopadium melaleucum.**

Müll. Arg. in Flora (1881), p. 107.

Brasilia: ad folia coriacea in horto botanico Janeirensi leg. Fr. de Höhnelt.

**660. Cladonia alpestris.**

Rabenh., Cladon. Europ. (1860), p. 11; Wainio, Monogr. Cladon. Univ., I (1887), p. 41, II (1894), p. 440 et III (1898), p. 223. — *Lichen rangiferinus alpestris* Linné, Spec. Plant. (1753), p. 1153.

Tirolia: ad terram humosam in alpe »Glungezer« prope Innsbruck  
leg. J. Schuler.

**661. Peltigera polydactyla.**

Hoffm., Deutsch. Fl., II (1796), p. 106; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 61; Nyl., Synops. Lich., I (1860), p. 326 (pr. p.); Arn. in Flora (1884), p. 236; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 135; Schwend. apud Näg., Beitr. wiss. Botan., 3. Heft (1863), S. 174—175; Bitter in Schwend. Festschrift (1899), S. 135; Glück in Verh. nat.-med. Ver. Heidelberg, N. F. VI (1899), S. 95, 116, 124 et 168. — *Lichen polydactylon* Neck., Meth. Muscor. (1771), p. 85.

Tirolia: ad terram in sylvis prope Ehrenburg in Pusterthal  
leg. E. Kernstock.

**662. Rinodina polyspora.**

Th. Fries, Lich. Arctoi (1860), p. 126 et Lichgr. Scand., I (1871), p. 206; Arn. in Flora (1881), p. 195 et (1884), p. 320. — *Lecanora polyspora* Nyl. in Notis. ur Sällsk. faun. et flor. fennic. förh., XI (1871), p. 182; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 402. — *Bérangeria polyspora* Trevis. in Atti Soc. Ital. sc. nat. Milano, XI (1868), p. 628 nat. et in Nuov. Giorn. Bot. Ital., I (1869), p. 127. — *Rinodina sophodes* Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 122; Jatta, Syll. Lich. Ital. (1900), p. 274.

Wurtemberg: ad corticem *Fraxinus excelsae* prope Echingen ad Danubium  
leg. F. X. Rieber.

**663. *Lecanora chlarona* var. *geographica*.**

Nyl. in Flora (1873), p. 69 et apud Crombie in Grevillea, XVIII (1890), p. 68; Oliv., Expos. syst. Lich. Ouest, I (1897), p. 274. — *Lecanora subfusca*  $\epsilon$ ) *geographica* Mass., Ricerch. sull'auton. (1852), p. 6; Hepp, Flecht. Europ., nr. 778. — *Lecanora rugosa* subsp. *L. chlarona*  $\beta$ ) *geographica* Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 414.

Austria inferior: ad corticem *Picearum* juniorum in monte Sonntagberg prope Rosenau leg. P. P. Strasser.

**664. *Phlyctis agelaea*.**

Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 391; Nyl., Lich. Scand. (1861), p. 184; Th. Fries, Lichgr. Scand., I (1871), p. 323; Arn. in Flora (1884), p. 422; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 512, fig. 72. — *Lichen agelaeus* Ach., Lich. Suec. Prodr. (1798), p. 30.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad corticem *Acerum* in monte »Kleiner Ahornberg« prope Szt. György, ca. 600 m s. m. leg. A. Zahlbruckner.

**665. *Parmelia fuliginosa* var. *laetevirens*.**

Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normand., VI (1872), p. 272; Wainio in Medd. Soc. faun. et flor. fennic., VI (1881), p. 124; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 255; Oliv., Expos. syst. Lich. Ouest, I (1897), p. 131; Harmand, Lich. Lothar. exs., nr. 308; Zwackh, Lich. exs., nr. 970. — *Imbricaria olivacea*  $\gamma$ ) *laetevirens* Fw., Lich. Siles. exs., nr. 90 (1829); Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 78; Arn. in Flora (1884), p. 164. — *Parmelia olivacea*  $\beta$ ) *laetevirens* Krphbr., Lichfl. Bayern (1861), p. 135. — *Parmelia olivacea isidioides* Rabenh., Lich. Europ., exs. nr. 715. — *Parmelia olivacea* var. *pannosa* Beltr., Lich. Bassan. (1858), p. 73.

Hohenzollern: ad corticem *Abietum* in sylvis densis prope Trillfingen

leg. F. X. Rieber.

**666. *Parmelia aspidota* var. *elegantula*.**

A. Zahlbr. in Verh. Ver. f. Natur- u. Heilk. Pressburg, N. F. VIII (1894), p. 39.

Thallus tenuior ut in planta typica, lobis marginalibus plus minus papillis exasperatis, in centro isidiis multipartitis, fere teretibus, densis, tenuibus, thallo concoloribus (olivaceo-fuscescentibus, nitidiusculis) dense obsitus. Medulla CaCl —. Apotheciorum margo tenuiter isidiosus. Sporae 10—12  $\mu$  longae et 5—5.5  $\mu$  latae.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad truncos *Castanearum* vetustarum in monte »Sauberg« prope Szt. György, ca. 300 m s. m. leg. A. Zahlbruckner.

**667. *Stereocaulon proximum* var. *gracilius*.**

Müll. Arg. in Revue mycol., I (1879), p. 164; Puiggari, Lich. Brasil., exs. nr. 1021.

Brasilia: ad terram et ad lapidos prope Theresiopolis leg. Fr. de Höhnelt.

**668. *Lecanora* (sect. *Placodium*) *fulgens*.**

Ach., Lichgr. Univ. (1810), p. 437; Th. Fries, Lichgr. Scand., I (1871), p. 222; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 357. — *Lichen fulgens* Sw. in Nov. Act. Upsal., IV (1794), p. 246. — *Psoroma fulgens* Mass., Ricerch. sull'auton. (1852), p. 21, fig. 33; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 118; Arn. in Flora (1884), p. 313. — *Fulgensia vulgaris* Mass. et Dntrs., Alc. gen. (1855), p. 11.

Austria inferior: ad terram calcaream in montibus prope Hainburg, 200—300 m s. m. leg. J. Baumgartner.



**669. Xanthoria candelaria.**

Arn. in Flora (1879), p. 362 et (1884), p. 244. — *Lichen candelarius* Ach., Lich. Suec. Prodr. (1798), p. 93.

**f. laceratula.**

Arn., Lich. exs., nr. 748 (1878).

Wurtemberg: ad saxa dolomitica in valle »Wendthal« prope Heidenheim  
leg. F. X. Rieber.

**670. Candelaria concolor.**

Wainio, Étud. Lich. Brésil., I (1890), p. 70. — *Lichen concolor* Dicks., Fasc. Cryptg. Britt., III (1793), p. 18. — *Candelaria vulgaris* Mass., Monogr. Lich. Blasteniosp. (1853), p. 64, fig. IX; Körb., Syst. Lich. Germ. (1855), p. 120. — *Xanthoria (Candelaria) concolor* Th. Fries, Lichgr. Scand., I (1871), p. 147. — *Lecanora (sect. Candelaria) laciniosa* Nyl. in Flora (1881), p. 454; Crombie, Monogr. Brit. Lich., I (1894), p. 367, fig. 62.

Hungaria: ad truncos *Paulowniarum* in horto academiae nauticae in Fiume  
leg. J. Schuler.

**Addenda:****355. b. Stereocaulon coralloides.**

E. Fries.

Tirolia: ad saxa muscosa in valle »Confinboden« ad pedem montis Langkofel  
leg. A. Zahlbruckner.

**Musci (Decades 14—16).****671. Cynodontium strumiferum.**

DNotrs., Epil. (1869), p. 280; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 1 (1886), p. 291, fig. 107. — *Dicranum strumifer* Ehrh., Pl. Crptg., nr. 74 (1786).

Tirolia: ad terram in ditione pagi Paneveggio

leg. H. Lojka, com. V. Schiffner.

**672. Racomitrium protensum.**

A. Braun apud Hüb., Muscol. Germ. (1833), p. 211; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 139, tab. 40; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 1 (1889), p. 796.

Bohemia: ad rupes gneissaceos humidus »Teufelswand« dictos prope Eisenstein,  
ca. 1000 m s. m.  
leg. E. Bauer.

**673. Racomitrium lanuginosum.**

Brid., Mant. (1819), p. 79; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 141, tab. 41; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 1 (1889), p. 812, fig. 207. — *Trichostomum lanuginosum* Hedw., Descr. Musc., III (1792), p. 3, tab. 2.

Bavaria: ad saxa gneissacea in cacumine montis »Grosser Arber«, ca. 1400 m s. m.  
leg. E. Bauer.

**674. Octoblepharum albidum.**

Hedw., Descr. Musc., III (1792), p. 15, tab. 6 A; C. Müll., Synops., I (1849), p. 86; Dozy et Molkb., Bryol. Javan., I (1855—1861), p. 27; Mitt. in Journ. Linn. Soc. Bot.

London, XII (1869), p. 109; Lesqu. et Jam., Manual Mus. N. Am. (1884), p. 91. — *Bryum albidum* Linn., Spec. plant. (1753), p. 1583.

Brasilía: ad truncos Palmarum in horto botanico Janeirensi

leg. Fr. de Höhnelt.

### 675. *Bryum Reyeri*.

Breidl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII (1887), S. 799 et Revue mycol. (1888), p. 35; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 2 (1892), p. 431.

Stiria: ad saxa schistosa irrorata ad »Rissachfall« prope Schladming

leg. J. Baumgartner.

### 676. *Catoscopium nigratum*.

Brid., Bryol. Univ., I (1826), p. 368; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 283, tab. 79; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 2 (1893), p. 518, fig. 309; Braithw., Brit. Mossfl., II, p. 216, tab. 77, fig. D. — *Weissia nigrita* Hedw., Descr. Musc., III (1792), p. 97, tab. 39.

Norvegia: ad terram prope Røisheim ad pedem montis Galdhøpig

leg. C. Loitlesberger.

### 677. *Polytrichum ohioense*.

Ren. et Card. in Revue Bryol., XII (1885), p. 11; Coult. in Botan. Gazette, XIII (1888), p. 199, tab. 17; Matousch. in Oest. Bot. Zeitschr. (1897), p. 213. — *Polytrichum decipiens* Limpr. in 68. Jahresb. Schles. Ges. f. vaterl. Cult., II (1890), S. 93 et apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., IV, 2 (1893), p. 618.

Bohemia: ad saxa granitica in saltu »Stolpichschlucht« in montibus »Isergebirge«, ca. 900 m s. m.

leg. V. Schiffner.

In Europa erst in neuerer Zeit entdeckt, und zwar im Riesengebirge<sup>1)</sup> und Thüringerwald. Im Jahre 1896 entdeckte ich es auch im Böhmerwalde (bei Hohenfurth), wo es seither Dr. E. Bauer an zahlreichen Stellen sammelte. Im Jahre 1898 fand ich es im Isergebirge, wo sein Verbreitungscentrum in Europa zu liegen scheint. Es ist auf den Kämmen des Isergebirges von etwa 850 m bis auf die Gipfel (über 1000 m) sehr verbreitet und kenne ich es dort von mehr als 30 Standorten. Ganz sicher trifft man es an allen jenen Granitgruppen, welche wie Burgruinen auf den Höhen sich aufthürmen. Es findet sich aber auch an morschen Fichtenstöcken, an Fichtenwurzeln und selten auch auf blossen Waldboden. Die hier aufgelegte Form ist die verbreitetste, doch ist das Moos ziemlich variabel im Habitus. Unsere europäische Pflanze stimmt vorzüglich in allen Details mit der aus Nordamerika überein, welche ich im Herbar besitze.

Dr. V. Schiffner.

### 678. *Heterocladium heteropterum*.

Bryol. Eur., fasc. 49—51 (1852), Monogr., p. 4, Tab. 2; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 307, tab. 87; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 2 (1895), p. 813. — *Pterogonium heteropterum* Bruch apud Schwägr., Suppl. III, vol. I (1827), tab. 210 b.

Bohemia: ad saxa granitica in monte »Theresienhöhe« prope Tannwald, ca. 600 m s. m.

leg. Fr. Matouschek.

<sup>1)</sup> Im October 1899 fand ich es auf einer mit Dr. E. Bauer gemeinsam unternommenen Excursion an neuen Standorten im Aupagrunde.



**679. Thuidium abietinum.**

Bryol. Europ., fasc. 49—51 (1852), Monogr., p. 9, tab. 5; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 2 (1895), S. 838. — *Hypnum abietinum* Linn., Spec. plant. (1753), p. 1126.

Bohemia: ad rupes calcareos inter gramina ad Tetin prope Prag

leg. E. Bauer.

**680. Eurhynchium striatum.**

Schimp., Coroll. (1856), p. 119; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 336, tab. 96; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 165. — *Hypnum striatum* Schreb., Spicil. Fl. Lips. (1771), p. 91; Braithw., Brit. Moss-Fl., XIX (1899), p. 73, tab. 98, fig. D.

Bohemia: ad terram et ad truncos putridos in sylvis ad Hirschbergen prope Salnau, ca. 800 m s. m.

leg. E. Bauer.

**681. Eurhynchium Tommasinii.**

Husn., Muscol. Gallic., II (1892), p. 338, tab. 97; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 179, fig. 385. — *Hypnum Tommasinii* Sendt. in sched.

Bohemia: ad saxa calcarea in sylva prope Karlstein

leg. V. Schiffner.

**682. Eurhynchium Swartzii.**

Curn. in Rabenh., Bryoth., fasc. XII, Nr. 593 (1862); Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 200. — *Hypnum Swartzii* Turn., Muscol. Hybern. (1864), p. 151, tab. 14, fig. 1; Braithw., Brit. Moss-Fl., XIX (1899), p. 81, tab. 100, fig. A.

Italia (Prov. Milano): in locis arenosis siccis ad Redeciesio prope Lombrata

leg. F. A. Artaria.

**683. Rhynchostegium megapolitanum.**

Bryol. Europ., fasc. 49—51 (1852), Monogr., p. 8, tab. 5; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 220. — *Hypnum megapolitanum* Bland., Musc. exs., III, nr. 147 (1804); Braithw., Brit. Moss-Fl., XIX (1900), p. 97, tab. 103, fig. C.

Italia (Prov. Pavia): in locis graminosis, Torre d'Isola apud Pavia, ca. 80 m s. m.

leg. F. A. Artaria.

**684. Rhynchostegium rusciforme var. inundatum.**

Bryol. Europ., fasc. 49—51 (1852), Monogr., p. 11, tab. 10, fig. 1—6; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), p. 232. — *Hypnum rusciforme* var. *inundatum* Brid., Bryol. Univ., II (1827), p. 500.

Bohemia: ad saxa granitica in rivulo Hammaleichtenbachs prope Hohenfurth, ca. 570 m s. m.

leg. V. Schiffner.

**685. Amblystegium curvicaule.**

Dix. et Jam., Stud. Handl. (1896), p. 447; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 305; Braithw., Brit. Moss-Fl., XVII (1896), p. 20, tab. 88, fig. B. — *Hypnum curvicaule* Jur. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV (1864), S. 103.

Stiria: ad saxa calcarea humida in cacumine montis »Tamischbachthurm« prope Hieflau, ca. 2000 m s. m.

leg. J. Baumgartner.

**686. Amblystegium fluviatile.**

Bryol. Europ., fasc. 62—64 (1855), Suppl., tab. I; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 360, tab. 103; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1897), S. 309; Braithw., Brit. Moss.-Fl., XVII (1896), p. 21, tab. 88, fig. D. — *Hypnum fluviatile* Sw., Disp. Musc. Suec. (1799), p. 63.

Bohemia: ad saxa granitica in rivulo »Hammerleichtenbach« prope Hohenfurth, c. 570 m s. m. leg. V. Schiffner.

**687. Hypnum uncinatum.**

Hedw., Descr. Musc., IV (1797), p. 65, tab. 25; Bryol. Europ., fasc. 57—61 (1854), Monogr., p. 31, tab. 20; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 377, tab. 108; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1898), p. 385.

Moravia: ad ligna putrida et ad arbores in valle »Bodenstadt« in montibus »Odergebirge«, ca. 340 m s. m. leg. Fr. Matouschek.

**688. Hypnum Vaucheri.**

Lesqu. in Mém. soc. Neufchat., III (1845), p. 48; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 406, tab. 117; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1899), p. 476, fig. 420.

a) Austria inferior: ad saxa calcarea ad ruinas arcis »Emmerberg« prope Wiener-Neustadt, ca. 350 m s. m. leg. J. Baumgartner.

b) Tirolia: ad vias solo calcareo inter Torbole et Nago ad lacum »Gardasee« leg. F. Arnold.

**689. Hypnum molluscum.**

Hedw., Descr. Musc., IV (1797), p. 56, tab. 22; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 409, tab. 118; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1898), p. 447.

Litorale austriacum: ad saxa calcarea in sylva »Trnovaner Wald« prope Görz leg. C. Loitlesberger.

**690. Hypnum hamulosum.**

Bryol. Europ., fasc. 57—61 (1854), Monogr., p. 20, tab. 10; Husn., Muscol. Gallic. (1884—1890), p. 400, tab. 115; Limpr. apud Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed. 2<sup>a</sup>, IV, 3 (1899), p. 491. — *Hypnum cupressiforme* var. *hamulosum* Brid., Spec. Musc., II (1812), p. 217.

Stiria: ad saxa schistosa humida in cacumine montis »Hexstein« prope Schlading, ca. 2550 m s. m. leg. J. Baumgartner.

**691. Gymnomitrium concinnatum.**

Corda in Sturm, Deutschl. Flora, II. Abth., Heft 19/20 (1830), S. 23, tab. 4; Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepatic. (1844), p. 43; Cooke, Handb. Brit. Hepat. (1894), p. 235, fig. 160—161. — *Jungermannia concinnata* Lightf., Fl. Scot., II (1789), p. 786; Engl. Bot., XXXI (1810), tab. 2229; Hook., Brit. Jungerm. (1816), p. 11, tab. 3. — *Acolea concinnata* Dum., Syll. Jungerm. (1831), p. 76, tab. 2, fig. 15. — *Cesius concinnatus* S. Gray, Nat. Arrang. Brit., pl. I (1821), p. 705.

Tirolia (Vorarlberg): ad terram arenosam in monte »Rauher Kopf« prope Langen, ca. 2000 m s. m. leg. C. Loitlesberger.



692. *Aplozia sphaerocarpoidea*.

Dum., Hepat. Europ. (1874), p. 60. — *Jungermannia sphaerocarpoidea* DNotrs. in Mem. Acad. Torino, XVIII (1858), p. 493, fig. 7.

*Litorale austriacum*: in fissuris saxorum calcareorum ad Isongo prope Görz  
leg. C. Loitlesberger.

693. *Jungermannia inflata*.

Huds., Fl. Anglic. (1778), p. 511; Hook., Brit. Jungerm. (1816), p. 11, tab. 38; Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepat. (1844), p. 105; Heeg in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII (1893), Abh., S. 86; Pears., Hepat. Brit. Isl. (1894), p. 198, fig. 142. — *Gymnocolea inflata* Dum., Revis. Jungerm. (1835), p. 17 et Hepat. Europ. (1874), p. 65; Cooke, Handb. Brit. Hepat. (1894), p. 189, fig. 142.

Bohemia: in turfosis prope Gottesgab in montibus »Erzgebirge«, ca. 1000 m s. m.  
leg. E. Bauer.

694. *Metzgeria conjugata*.

Lind. in Act. Soc. Fennic., X (1875), p. 495 et Monogr. Metzger. (1877), p. 29, tab. I, fig. 6 (ubi synonym.); Heeg in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII (1893), p. 126; Schiffn. in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., I, 3 (1893), fig. 30.

Moravia: ad radices arborum et ad saxa in saltu »Zbraschauer Schlucht« prope  
Mährisch-Weisskirchen  
leg. C. Loitlesberger.

695. *Plagiochila spathulaefolia*.

Mitt. in Journ. Linn. Soc. Bot. Lond., V (1861), p. 96.

Java: ad arborum truncos in monte ignivomo Gedeh supra lacum dictum »Kandang-Badag«, ca. 2600 m  
leg. V. Schiffner.

696. *Lophocolea Kurzii*.

v. d. Sde. Lac. in Ann. Mus. Lugd.-Batav., I (1864), p. 296, tab. 7.

Java: ad *Arengae sacchariferae* truncos in agro Buitenzorgensi, ca. 250 m s. m.  
leg. V. Schiffner.

697. *Chiloscyphus coalitus* var. *affinis*.

Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepat. (1844), p. 180; v. d. Sde. Lac. in Ann. Mus. Lugd.-Batav., I (1864), p. 297. — *Jungermannia affinis* Rw., Bl. et Nees in Nov. Act. Leop., XII, 1 (1829), p. 205 — *Jungermannia coalita* var. *affinis* Nees, Enum. pl. cryptg. Javae Hepat. (1830), p. 23.

Java: ad saxa calcarea in sylva primaeva in agro Buitenzorgensi  
leg. V. Schiffner.

698. *Prionolobus Turneri*.

Spruce in Trans. et Proceed. Bot. Soc. Edinb., XV (1885), p. 507, not.; Schiffner in Engler-Prantl, Natürl. Pflzfam., I, 3 (1895), S. 98; Pears., Hepat. Brit. Isl. (1900), p. 190, tab. 74. — *Jungermannia Turneri* Hook., Brit. Jungerm. (1816), p. 11, tab. 29; Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepat. (1844), p. 143. — *Cephaloxia Turneri* Lind. in Journ. Linn. Soc. Bot. Lond., XIII (1873), p. 19 et in Act. Soc. Fennic., X (1875), p. 502; M. A. Howe in Mem. Torrey Bot. Club, VII (1899), p. 129.

California: ad terram saxosam umbratamque in montibus maritimis  
leg. Marshall A. Howe.

699. *Lejeunia cavifolia*.

Lind., Musc. Scand. (1879), p. 2; Heeg in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII (1893), p. 115. — *Jungermannia cavifolia* Ehrh., Beitr. z. Naturk., IV (1790), p. 45. — *Lejeunia serpyllifolia* Lind. in Ann. gen. sc. phys., VI (1820), p. 374, tab. 96, fig. 2 (pr. p.); Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepat. (1844), p. 375; Pears., Hepat. Brit. Isl. (1899), p. 45, tab. 10.

Moravia: ad saxa inter muscos in valle »Bodenstadter Thal« in montibus »Odergebirge« leg. Fr. Matouschek.

700. *Frullania Asagrayana*.

Montg. in Ann. sc. nat. Bot., 2<sup>e</sup> sér., XVIII (1842), p. 14, not.; Gottsch., Lindbg. et Nees, Synops. Hepat. (1844), p. 441.

America borealis (United States): in praeruptis ad Croton River in civitate New-York leg. Marshall A. Howe.

Addenda:

278, b. *Cephalozia bicuspidata*.

Dum.

Litorale austriacum: ad terram argillaceam in sylva »Reconitzer Wald« prope Görz leg. C. Loitlesberger.

589, b. *Bartramia pomiformis*.

Roth.

Moravia: ad terram humosam in sylva sub »Rybář« prope Ungarisch-Hradisch leg. Fr. Matouschek.

600. *Anomodon Rugelii*.

(C. Müll.) Keissl.

Hungaria (Com. Poseniensis): ad saxa quartzosa umbrosa in monte »Modreiner Kogel« prope Modor, ca. 600—700 m s. m. leg. J. Baumgartner.



	K h
Koechlin, Dr. R. Ueber Simonyit- und Glauberitkrystalle von Hallstatt . . . . .	1.40
— Ueber Glauberit vom Dürnberg bei Hallein. (Mit 1 Abbildung im Texte) . . . . .	—40
Koelbel, K. Beiträge zur Kenntniss der Crustaceen der Canarischen Inseln. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.60
Kohl, Fr. Ueber neue und seltene Antilopen des K. K. Naturhist. Hofmuseums. (Mit 4 Tafeln) . . . . .	4.—
— Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. I. Monographie der natürlichen Gattung <i>Sphex</i> Linné (sens. lat.). I. Abtheilung (mit 5 Tafeln) und II. Abtheilung . . . . .	17.—
— Ueber <i>Ampulex</i> Jur. (s. l.) und die damit enger verwandten Hymenopteren-Gattungen. (Mit 3 lithogr. Tafeln) . . . . .	5.—
— Neue Hymenopterenformen. (Mit 3 Tafeln) . . . . .	4.—
— Zur Hymenopterenfauna Afrikas. (Mit 5 Tafeln) . . . . .	7.—
— Zur Monographie der natürlichen Gattung <i>Sphex</i> Linné. (Mit 2 lithogr. Tafeln) . . . . .	3.60
— Die Gattungen der Sphegiden. (Mit 7 lithogr. Tafeln und 90 Abbildungen im Texte) . . . . .	23.40
— Zur Kenntniss der europäischen <i>Polistes</i> -Arten. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.20
— Zur Kenntniss neuer gestachelter Hymenopteren. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.60
— Zur Kenntniss der Hymenopterengattung <i>Eidopompilus</i> Kohl. (Mit 1 Tafel) . . . . .	—40
Konow, Fr. W. Systemat. und kritische Bearbeitung der Blattwespen-Tribus <i>Lydini</i> . I.—II. . . . .	2.80
Linck, G. Der Meteorit (Chondrit) von Meuselbach i. Th. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	2.60
Lorenz, Dr. L. v. Die Ornis von Oesterreich-Ungarn und den Occupationsländern im K. K. Naturhistorischen Hofmuseum zu Wien . . . . .	2.—
— Ueber einen vermuthlich neuen <i>Dendrocolaptiden</i> . (Mit 1 Tafel in Farbendruck) . . . . .	1.—
Lütkenmüller, Dr. Desmidiaceen aus den Ningpo-Mountains in Centralchina. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.40
Marenzeller, Dr. E. v. Ueber die adriatischen Arten der Schmidt'schen Gattungen <i>Stelletta</i> und <i>Ancorina</i> . (Mit 2 Tafeln) . . . . .	2.60
— Annulaten des Beringsmeeres. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.60
Marktanner-Turneretscher, G. Beschreibung neuer Ophiuriden und Bemerkungen zu bekannten. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.60
— Die Hydroiden des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. (Mit 5 Tafeln) . . . . .	9.—
Mayr, Dr. G. Afrikanische Formiciden. (Mit 3 Abbildungen im Texte) . . . . .	2.—
— Südafrikanische Formiciden, gesammelt von Dr. Hans Brauns. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.60
Melichar, Dr. L. Monographie der Ricaniiden ( <i>Homoptera</i> ). (Mit 6 Tafeln und 1 Abbildung im Texte) . . . . .	14.—
Niessl, G. v. Ueber das Meteor vom 22. April 1888 . . . . .	1.60
Pelzeln, A. v., und Lorenz, Dr. L. v. Typen der ornithologischen Sammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums (I.—IV. Theil) . . . . .	4.40
— Geschichte der Säugethier- und Vogel-Sammlung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums . . . . .	2.—
Penther, Dr. A. Zur Kenntniss der Arachnidenfauna Südafrikas ( <i>Scorpiones</i> ). (Mit 2 Abbildungen im Texte) . . . . .	—60
Rebel, Dr. H. Beitrag zur Microlepidopterenfauna des canarischen Archipels. (Mit 1 Tafel) . . . . .	3.—
— Vierter Beitrag zur Lepidopterenfauna der Canaren. (Mit 1 Abbildung im Texte) . . . . .	1.—
— und Rogenhofer, A.: Zur Lepidopterenfauna der Canaren. (Mit 1 Tafel) . . . . .	6.—
Redtenbacher, J. Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insecten. (Mit 12 Tafeln) . . . . .	10.—
Rogenhofer, A. F. Afrikanische Schmetterlinge des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. I.—II. (Mit 2 Tafeln in Farbendruck) . . . . .	4.—
Rosa, Dr. D. Die exotischen Terricolen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.20
Rzehak, A. Ueber einige merkwürdige Foraminiferen aus dem österreichischen Tertiär. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.—
Schletterer, A. Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden. I.—III. Abtheilung. (Mit 6 Tafeln) . . . . .	18.—
Siebenrock, F. Zur Kenntniss des Kopfskelettes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	4.—
— Das Skelet von <i>Uroplatus fimbriatus</i> Schneid. (Mit 1 lith. Tafel u. 2 Abbild. im Texte) . . . . .	2.—
— Zur Kenntniss des Rumpfskelettes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden. (Mit 1 Tafel und 4 Abbildungen im Texte) . . . . .	2.40
— Ueber den Bau und die Entwicklung des Zungenbein-Apparates der Schildkröten. (Mit 2 Tafeln und 2 Abbildungen im Texte) . . . . .	2.80
Simony, Prof. Dr. O. Photographische Aufnahmen auf den Canarischen Inseln . . . . .	1.20
Steindachner, Dr. Fr. Ueber die Reptilien und Batrachier der westlichen und östlichen Gruppe der canarischen Inseln . . . . .	1.—
— Ueber neue und seltene Lacertiden aus den herpetologischen Sammlungen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.—
— Ueber die typischen Exemplare von <i>Lacerta mosorensis</i> . (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.40
— Bericht über die während der Reise Sr. Maj. Schiff »Aurora« von Dr. C. Ritter v. Mierszewski in den Jahren 1895 und 1896 gesammelten Fische. (Mit 1 lithogr. Tafel) . . . . .	2.60
Steuer, Dr. Adolf. Die Entomostraken der Plitvicer Seen und des Blata-Sees (Croatien), gesammelt von Dr. R. Sturany (1895). (Mit 3 Tafeln und 8 Abbildungen im Texte) . . . . .	4.40
Sturany, Dr. R. Zur Molluskenfauna der europäischen Türkei. Nebst einem Anhang, betreffend die Nacktschnecken, von Dr. H. Simroth. (Mit 3 Tafeln) . . . . .	4.—
— Ueber die von Dr. H. Rebel in Bulgarien 1896 gesammelten Gehäuse-schnecken. (1 Taf.) . . . . .	1.40
Suess, Dr. Fr. E. Beobachtungen über den Schlier in Oberösterreich und Bayern. (Mit 3 Abbildungen im Texte) . . . . .	1.20
Thon, K. Ueber eine neue parasitische <i>Afax</i> -Art aus Texas. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.20
Weisbach, Dr. A. Einige Schädel aus Ostafrika. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	2.40
Weithofer, A. Ueber einen neuen <i>Dicynodonten</i> ( <i>Dicynodon simocephalus</i> ) aus der Karrooformation Südafrikas. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.40
— Ueber ein Vorkommen von Eselsresten in der Höhle »Pytina jama« bei Gabrowitza . . . . .	1.40
Zahlbruckner, Dr. A. Beitrag zur Flora von Neu-Caledonien. (Mit 2 Tafeln) . . . . .	3.20
— Ueber einige Lobeliaceen des Wiener Herbariums. (Mit 1 Abbildung im Texte) . . . . .	1.—
— <i>Pannaria austriaca</i> n. sp. (Mit 1 Tafel in Farbendruck) . . . . .	1.20
— <i>Stromatopogon</i> , eine neue Flechtengattung. (Mit 1 Tafel) . . . . .	1.20
— <i>Plantae Pentherianae</i> . Pars I. (Mit 4 Tafeln und 5 Abbildungen) . . . . .	7.20
— Schedae ad »Kryptogamas exsiccatas«. Centuria VII . . . . .	1.20



---

Druck von ADOLF HOLZHAUSEN in Wien  
K. UND K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKER

---